

PROGRAM ZAŠTITE I ISHRANE BILJAKA

2026



**GALENIKA
FITOFARMACIJA**



GALENIKA - FITOFARMACIJA

▶▶▶ **TRADICIJA**



▶▶▶ **POVERENJE**

- **Najveći proizvođač** sredstava za zaštitu bilja u Republici Srbiji
- Portfolio od **125 proizvoda visokog kvaliteta** iz segmenta zaštite i ishrane biljaka
- Kompanija ima **176 zaposlenih** (50% ima visoku stručnu spremu)
- Sertifikovani sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa standardom **ISO 9001:2015**, sistem menadžmenta životnom sredinom prema standardu **ISO 14001:2015** i sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu u skladu sa standardom **ISO 45001:2018**
- Laboratorija za fizičko hemijsko ispitivanje je akreditovana u skladu sa zahtevima standarda **ISO/IEC 17025:2017**. Pored toga, laboratorija ima sertifikat za sprovođenje **GLP** ispitivanja za potrebe registracije proizvoda, u skladu sa Smernicama dobre laboratorijske prakse
- Savremen i u **potpunosti automatizovan** proces proizvodnje
- Izvozimo u **29 zemalja** (19 zemalja EU, ali i Rusiju, Veliku Britaniju, Ujedinjene Arapske Emirate, Severnu Makedoniju, BiH, Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju, Gruziju i Azerbejdžan)
- **Korporativna odgovornost** prema:
 - Poljoprivrednim proizvođačima
 - Poslovnim partnerima
 - Lokalnoj zajednici
 - Životnoj sredini



NOVI PROIZVODI U 2026.



Herbicidi

CERES

a.s. jodosulfuron-metil-natrijum
+ amidosulfuron
+ protektant mefenpir-dietil

Selektivni, translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevima pšenice i ječma.



Fungicidi

AVANGARD

a.s. sumpor

Nesistemični preventivni fungicid namenjen za suzbijanje prouzrokovala pepelnice u zasadu jabuke



BORVO

a.s. bakar iz bordovske čorbe

Folijarni fungicid, namenjen za suzbijanje prouzrokovala plamenjače u zasadu vinove loze.



EVOLVENTE

a.s. folpet
+ fosetil - aluminijum

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, namenjen za suzbijanje prouzrokovala plamenjače u zasadu vinove loze.



GALOKSID FLOW

a.s. bakar - iz bakar hidroksida

Nesistemični preventivni fungicid i baktericid, namenjen za suzbijanje prouzrokovala pegavosi lista u usevu šećerne repe, crne truleži i plamenjače kupusa, plamenjače krastavca, plamenjače i purpurne pegavosti luka.



Insekticidi

ADUT

a.s. acekvinocil

Kontaktini akaricid namenjen za suzbijanje grinja u zasadima jabuke i višnje, kao i u usevu paradajza u zaštićenom prostoru.



LAGUNA

a.s. hlorantraniliprol

Larvicidni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen za suzbijanje štetnih insekata u voćarstvu, povrtarstvu i ratarstvu.





Preporuka za primenu sredstava za zaštitu bilja

Stručni tim kompanije GALENIKA-FITOFARMACIJA nastoji da poljoprivrednim proizvođačima obezbedi kvalitetna i adekvatna sredstva za zaštitu i ishranu biljaka. Takođe, cilj nam je da utičemo na povećanje kvaliteta i kvantiteta prinosa gajenih biljaka registracijama odgovarajućih proizvoda i predloženim planovima zaštite i ishrane po kulturama.

Za sve savete i preporuke u vezi sa primenom naših proizvoda možete se obratiti stručnim saradnicima ili regionalnim menadžerima. Kontakte možete pronaći na poslednjoj strani brošure.

Visoka biološka efikasnost, registracija za suzbijanje određenih štetnih agenasa u gajenim kulturama, nizak rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu su kriterijumi koji određuju pravilan izbor sredstava za zaštitu bilja. Pre nego što se opredelite za upotrebu izabranih pesticida, bilo da ste profesionalni korisnik ili lice koje ih povremeno upotrebljava, trebalo bi obavezno da imate u vidu sledeće napomene:

- Kada god je moguće nastojte da primenjujete integralni koncept zaštite bilja, odnosno hemijsko suzbijanje treba da bude samo jedna mera u celokupnom **sistemu zaštite bilja**, koji podrazumeva i primenu agrotehničkih i bioloških mera u suzbijanju štetnih organizama;
- Efikasnost pesticida uslovljena je njegovom **pravovremenom primenom** u odnosu na štetne agense, fenofaze gajene biljke, trenutne i predviđene vremenske uslove;
- Pre upotrebe preparata obavezno **pročitajte uputstvo** i pridržavajte se znakova opasnosti, oznaka upozorenja i obaveštenja navedenih u uputstvu i na etiketi. Potrebno je da znate i kako da se adekvatno ponašate u slučaju nezgode prilikom rukovanja pesticidima;
- Pri radu sa sredstvima za zaštitu bilja treba se pridržavati opštih mera higijensko-tehničke zaštite, odnosno sprečiti kontakt sa kožom i sluzokožom **korišćenjem odgovarajuće zaštitne odeće i opreme**;
- Neposredno pre primene sredstava za zaštitu bilja, neophodno je **proveriti ispravnost prskalice** u zaštiti bilja, a to podrazumeva njihovu redovnu kalibraciju i ispravnost rasprskivača i drugih delova prskalice;
- Obavezno uzmite u obzir **vremensku prognozu** prilikom izbora vremena aplikacije. Ukoliko se vremenski uslovi pogoršaju prestanite sa tretiranjem. Izbegavajte tretiranje u blizini osetljivih biljnih vrsta i voda ukoliko postoji opasnost od zanošenja na njih;
- Veoma je važno obratiti pažnju da prilikom primene istog preparata u vegetacionoj sezoni ili preparata sa sličnim mehanizmom delovanja može doći do promene osetljivosti ili potencijalne **pojave rezistentnosti** kod populacija štetnih organizama. Stoga je neophodno sprovoditi mere antirezistentne strategije koje podrazumevaju primenu preparata sa različitim mehanizmima delovanja;

Podsećamo vas takođe, da nakon rada sa pesticidima obavezno:

- » **Operite prskalice i orošivače** koji su korišćeni pri aplikaciji, ako je to moguće na mestu primene pesticida;
- » Tokom pripreme rastvora za tretiranje, nakon dodavanja pesticida, praznu ambalažu dobro isperite vodom (najmanje 3 puta), tečnost dodajte u tank prskalice, nakon toga ambalažu izbušite na više mesta i **odložite na mesta određena za prikupljanje ambalaže** od pesticida;
- » Pri aplikaciji pesticida obavezno **koristite zaštitnu opremu**.



Napomena: Pregled sredstava za zaštitu i ishranu bilja iz proizvodnog programa GALENIKA-FITOFARMACIJE a.d. napravljen je u propagandne svrhe, sa namerom da svi podaci u njemu budu tačno navedeni. Ipak, ne možemo biti odgovorni za netačnosti koje se eventualno pojavljuju u tekstu, a koje bi mogle biti uzrok neadekvatne primene naših proizvoda. Stoga, u najboljoj nameri preporučujemo da se prilikom upotrebe i čuvanja naših preparata, kao i ostalih sredstava za zaštitu bilja, pridržavate detaljnih informacija u uputstvu za upotrebu koje je priloženo uz proizvod.



Redosled mešanja različitih tipova formulacija sredstava za zaštitu bilja i folijarnih đubriva

Pre nego što se odlučite da kombinujete više preparata obavezno pročitati uputstvo u kome se nalaze i informacije o mogućnostima mešanja.

Pripremanje tank - miksa, više različitih oblika formulacija, vrši se po sledećem redosledu:

- U manjoj količini vode (u posudi manje zapremine) dobro se izmešaju **kvašljivi praškovi – WP** ili **vododisperzibilne granule – WG** i nakon toga se dodaju u prskalicu, prethodno napunjenu do 1/3 vodom, uz stalno mešanje.
- Zatim se u prskalicu dodaju **koncentrovane suspenzije – SC**, takođe prethodno pripremljene u manjoj količini vode i mešaju se zajedno.
- Potom se dodaju **koncentrati za emulziju – EC**, uz neprekidno mešanje.
- Za njima se dodaju preparati formulisani kao **vodeni rastvori – SL**.
- **Folijarna hraniva** se dodaju na kraju.
- Dopuniti rezervoar potrebnom količinom vode.

Poželjno je pripremljenu kombinaciju preparata potrošiti u što kraćem vremenskom periodu, pridržavajući se svih propisa.

Ako se upotrebljava **voda koja je baznog karaktera** onda se folijarna hraniva dodaju na početku, dok se svi ostali tipovi formulacija dodaju po gore navedenom redosledu.

PRIMER:

GALILEO (WG)

+

INSAJDER (SC)

+

HARPUN (EC)

+

FOLIGAL FEED SUPER (folijarno đubrivo)

Utrošak vode

Primenu preparata prskanjem izvoditi sa sledećim količinama vode po ha:

- Voćnjaci, vinogradi, ukrasno bilje i zasadi sličnog habitusa:
600–1000 l (6–10 l na 100 m² tj. 1 ar)
- Malina i kupina, žbunasto voće:
300–600 l (3–6 l po 100 m² tj. 1 ar)
- Ratarski usevi:
200–400 l (2–4 l po 100 m² tj. 1 ar)
- Povrtarski usevi:
200–600 l (2–6 l po 100 m² tj. 1 ar)



Potrebne količine sredstava u zavisnosti od njihove koncentracije i zapremine prskalice

Koncentracija	ZAPREMINA PRSKALICE (litar)							
	1	5	10	15	20	50	100	400
	POTREBNA KOLIČINA SREDSTVA (g, ml)							
0,01 %	0,1	0,5	1	1,5	2	5	10	40
0,05 %	0,5	2,5	5	7,5	10	25	50	200
0,10 %	1,0	5,0	10	15	20	50	100	400
0,15 %	1,5	7,5	15	22	30	75	150	600
0,30 %	3,0	15	30	45	60	150	300	1200
0,50 %	5,0	25	50	75	100	250	500	2000
1,0 %	10	50	100	150	200	500	1000	4000



ASTRID je stigao!

Za odličan start kukuruza,
bez korova!!!



**Od setve
pa sve
do 3. lista
kukuruza!!!**



► Zaštita kukuruza



Faza razvoja/Vreme primene	Namena	Preparat	Količina/ koncentracija primene	Karenca (dani)
	Tretiranje u redove istovremeno sa setvom	Tekton	7 - 10 kg/ha	OVP
	Posle setve a pre nicanja	*Logan + Rezon	0,4 l/ha 1 l/ha	OVP OVP
	Posle nicanja do trećeg lista kukuruza	Logan ili Astrid	0,4 l/ha 0,4 l/ha	OVP OVP
	Od drugog do petog lista kukuruza	Talisman + Plamen	1,25 l/ha	OVP
		ili	0,5 - 0,7 l/ha	OVP
		Persej + Plamen + Alteox T Prima	40 - 60 g/ha 0,5 - 0,7 l/ha 0,2 l/ha	63 OVP
	Od drugog do osmog lista kukuruza	Talisman + Skaut	1,25 l/ha 0,25 l/ha	OVP OVP
	Tokom skladištenja	Etiol ultra	10 - 40 ml/t zrna/1 l vode	7

*Ukoliko se koristi Logan posle setve a pre nicanja kukuruza, ne treba ponovo primenjivati Logan ili Astrid posle nicanja kukruza u istoj godini

► Program ishrane kukuruza

	Vreme primene	Folijarna prihrana	Količina primene
	3 - 5 listova (uz herbicidni tretman)	Activeg Vegetative ili Fitopin	2 - 3 l/ha 50 ml/ha
	5 - 8 listova	Foligal Turbo K	2 l/ha

► Zaštita pšenice



Faza razvoja/Vreme primene		Namena	Preparat	Količina/ koncentracija primene	Karenca (dani)
	Od bokorenja do prvog kolenca	jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi	Monosan herbi 500	1,5 - 2 l/ha	OVP
	Od bokorenja do drugog kolenca	jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi	Detektor + Alteox T Prima	15 - 25 g/ha 0,1 - 0,2 l/ha	OVP
	Od bokorenja do drugog kolenca	regulator rasta	Trident	0,3 - 0,5 l/ha	OVP
	Od bokorenja do pojave lista zastavičara	bolesti lista i stabla	Pylon ili Akord	0,4 - 0,6 l/ha	35
			+	0,5 - 1 l/ha	OVP
		žitna pijavica, biljne vaši	Polux ili Kozak	0,2 - 0,3 l/ha	35
				0,15 l/ha	35
		uskolisni korovi uključujući divlji ovas	**Pampas	1-1,2 l/ha	OVP
		jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi uključujući i bročiku/prilepaču	Octanus	25 g/ha	OVP
			ili		
			*Ceres (NOVO)	0,15 l/ha	OVP
ili					
	Tezis + Bonaca EC	10 g/ha 0,4 l/ha	OVP OVP		
	Početak cvetanja	fuzarioza klasa i bolesti lista i stabla	Pylon plus ili Duplex pro	0,5 - 0,7 l/ha 0,8 l/ha	35 35
	Strnište - posle žetve pšenice	totalno suzbijanje svih korova	Glifol	3 - 10 l/ha	OVP
	Tokom skladištenja	suzbijanje skladišnih štetočina	Etiol ultra	10 - 40 ml/t zrna/1 l vode	7

*U toku je proces registracije

**Pampas je registrovan do lista zastavičara pšenice, ali preporučujemo raniji tretman dok je divlji ovas od faze nicanja do pred bokorenje.

► Program ishrane pšenice

	Vreme primene	Folijarna prihrana	Količina primene
	Od bokorenja do zastavičara (uz prvi herbicidni i fungicidni tretman)	Chopin Evolution ili Fitopin	3 l/ha 50 - 100 ml/ha
	Početak cvetanja (uz tretman protiv fuzarioza klasa)	Foligal Turbo P	2 l/ha

Za čistu pšenicu bez korova i bolesti!

NOVO

Ceres

Octanus

Pampas



Pylon



Pylon[®] plus





▶ Zaštita soje



Faza razvoja/Vreme primene	Namena	Preparat	Količina/ koncentracija primene	Karenca (dani)
	Posle setve, a pre nicanja	jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi	Factor	0,12 l/ha OVP
	Folijarno suzbijanje korova, posle nicanja soje i korova (soja u fazi 1 - 3 troliske)	jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi	*Ritmix plus + Alteox T Prima	1,8 l/ha 0,1 - 0,2 l/ha OVP
			ili	
		jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi	Rampa EC + Galbenon + Okvir + Alteox T Prima	0,3 - 0,4 l/ha 2 l/ha 8 g/ha 0,1 - 0,2 l/ha OVP
			ili	
			Galbenon + Okvir + Kvazar	2 l/ha 8 g/ha 1 - 1,2 l/ha 63 OVP 35
	Od formiranja prve troliske do cvetanja	jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi	Spektrum ili Rafal 120 ili Globus EC	1,3 l/ha 1,5 - 2 l/ha 1,5 - 2 l/ha OVP OVP 77

*Primenjuje se u split aplikaciji (0,9 l/ha + 0,9 l/ha) uz dodatak okvašivača, prvi put po nicanju korova, a drugi put 7-14 dana nakon prvog tretmana, do treće troliske soje



▶ Program ishrane soje



Vreme primene	Folijarna prihrana	Količina primene
1 - 3 troliske	Foligal Turbo S	2 l/ha
Pre cvetanja	Foligal Feed Bor 150 + Activeg Gold	2 l/ha
		2 l/ha

▶ Zaštita suncokreta



Faza razvoja/Vreme primene	Namena	Preparat	Količina primene	Karenca (dani)
SUZBIJANJE ŠTETOČINA				
	Tretiranje u redove istovremeno sa setvom	zemljišne štetočine	Tekton	7 - 10 kg/ha OVP
SUZBIJANJE KOROVA				
	Posle setve, a pre nicanja	jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi	Basar + Rezon	1 - 1,2 l/ha 1,5 l/ha OVP OVP
	Od drugog do trećeg para listova	širokolisni i jednogodišnji uskolisni korovi	*Kvazar (primenjuje se isključivo u hibridima tolerantnim na imidazolinone)	1,2 l/ha OVP
	Folijarno suzbijanje korova	jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi	Spektrum ili Rafal 120 ili Globus EC	1,3 l/ha 1,5 - 2 l/ha 1,5 - 2 l/ha OVP OVP OVP

*Primenjuje se isključivo u hibridima tolerantnim na imidazolinone

▶ Program ishrane suncokreta

	Vreme primene	Folijarna prihrana	Količina primene
	2-3 para listova	Activeg Gold + Fitopin	2 l/ha 50 ml/ha
	3-5 para listova	Foligal Turbo S	2 l/ha



► Zaštita šećerne repe



Faza razvoja/Vreme primene	Namena	Preparat	Količina primene	Karenca (dani)
SUZBIJANJE ŠTETOČINA				
	Tretiranje u redove istovremeno sa setvom	zemljišne štetočine	Tekton	5 kg/ha OVP
	Suzbijanje štetočina u vegetaciji	štetni insekti, lisne sovice	Cipkord 20 EC ili	0,3 l/ha 35
			Kozak	0,2 l/ha 14
SUZBIJANJE KOROVA				
	Folijarno suzbijanje korova	jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi: palamida, ambrozija, abutilon, samonikli suncokret i dr.	Lontrel 100 ili	0,6 - 1,2 l/ha OVP
			Pikogal plus	0,2 - 0,4 l/ha OVP
			+	
		jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi	Metak 700 SC	1,5 - 3 l/ha OVP
			Spektrum ili	1,3 l/ha 70
			Globus EC ili	1,5 - 2 l/ha 77
Rafal 120	1,5 - 2 l/ha OVP			
SUZBIJANJE BOLESTI				
	Preventivno i po pojavi prvih simptoma	pegavost lista	Galoksid ili	2 kg/ha 21
			*Galoksid flow	3 l/ha 21
			Galoksid + Duplex pro + Nu Film 17	2 kg/ha 21 0,8 l/ha 28 0,3 l/ha
			Galoksid + Pylon + Nu Film 17	2 kg/ha 21 0,6 l/ha 35 0,3 l/ha
			Galoksid + Sekvenca + Nu Film 17	2 kg/ha 21 0,4 - 0,6 l/ha 14 0,3 l/ha

* u pocesu registracije

► Program ishrane šećerne repe

	Vreme primene	Folijarna prihrana	Količina primene
	Posle nicanja uz prvi insekticidni tretman	Fitopin	50 ml/ha
	Intenzivan porast lisne mase	Activeg Vegetative	3 l/ha
	Uz tretman za suzbijanje uskolisnih korova	Foligal Feed Bor 150	2-3 l/ha

► Zaštita uljane repice



Faza razvoja/Vreme primene	Namena	Preparat	Količina primene	Karenca (dani)
SUZBIJANJE ŠTETOČINA				
	Suzbijanje štetočina u jesen	repičina lisna osa	Polux	0,3 l/ha 42
	Suzbijanje štetočina u proleće	štetni insekti	Polux	0,3 l/ha 42
		repičin sjajnik	Karika	0,3 - 0,4 l/ha 42
SUZBIJANJE KOROVA				
	Inkorporacija	jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi	Rampa EC	0,3 l/ha OVP
	U fazi 2 lista ili 10 - 15 cm visine	jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi	Lontrel 100 ili Pikogal plus	0,6 - 1 l/ha 0,2 - 0,3 l/ha OVP OVP
		jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi	Globus EC	1,5 - 2 l/ha OVP
SPREČAVANJE RASIPANJA SEMENA				
	Pred žetvu	sprečavanje pucanja mahuna	Nu Film 17	0,7 l/ha

► Program ishrane uljane repice

	Vreme primene	Folijarna prihrana	Količina primene
	U fazi intenzivnog porasta	Chopin Evolution	3 l/ha
	Pre cvetanja	Foligal Feed Bor 150	1 - 2 l/ha



► Zaštita lucerke



Faza razvoja/Vreme primene	Namena	Preparat	Količina/ koncentracija primene	Karenca (dani)	
	Mirovanje (pre kretanja vegetacije)	jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi	*Okvir + Alteox T Prima	15 - 20 g/ha 0,1 - 0,2%	OVP
	Od prve do treće troliske	jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi	*Galbenon	2 l/ha	63
		jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi	**Kvazar	1 - 1,2 l/ha	35
		jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi	Rafal 120	1,5 - 2 l/ha	OVP
	Pre prvog otkosa	larve lucerkine bube	Tonus	0,25 kg/ha	28

*Dozvoljena je primena isključivo u zasnovanoj lucerki koja je starija od 12 meseci

**Može se primenjivati u split aplikaciji 0,6 l/ha + 0,6 l/ha

► Program ishrane lucerke

	Vreme primene	Folijarna prihrana	Količina primene
	Od prve do treće troliske uz herbicidni tretman	Foligal Feed Super	2 - 3 l/ha
	Posle svakog otkosa (može i sa insekticidnim tretmanom)	Solugal Universal NPK 20-20-20+ME	2 - 3 kg/ha

► Zaštita ozimog i jarog ječma



Faza razvoja/Vreme primene	Namena	Preparat	Količina primene	Karenca (dani)	
	Prvo kolenca	jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi	Monosan herbi	1,5 l/ha	OVP
		bolesti lista i stabla	Pylon	0,4 - 0,6 l/ha	35
	Od drugog kolenca do pojave lista zastavičara	larve žitne pijavice, biljne vaši	Polux	0,2 - 0,3 l/ha	35
		jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi, uključujući i Galium aparine	*Ceres (NOVO)	0,15 l/ha	OVP
			ili		
			Tezis + Alteox T Prima	10 g/ha 0,1 - 0,2 l/ha	OVP
	Početak cvetanja	fuzarioza klasa	Pylon	0,4 - 0,6 l/ha	35
	Strnište - posle žetve ječma	totalno suzbijanje svih korova	Glifol	3 - 10 l/ha	OVP

*U toku je proces registracije

► Program ishrane ozimog i jarog ječma

	Vreme primene	Folijarna prihrana	Količina primene
	Od bokorenja do zastavičara (uz tretman protiv korova i bolesti)	Chopin Evolution ili Foligal Turbo P	3 l/ha 2 l/ha
	Početak cvetanja (uz tretman protiv fuzarioza klasa)	Foligal Feed Super	3 l/ha



► Zaštita krompira



Faza razvoja/Vreme primene	Namena	Preparat	Količina primene	Karenca (dani)
	Pri sadnji i pri zagrtanju	zemljišne štetočine	Galition ultra	12 - 15 kg/ha OVP
	Po sadnji, a pre nicanja	jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi	Zanat	4 - 6 l/ha 63
	Usev porasta 15-20 cm	jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi	Rafal 120 ili Spektrum	1 - 2 l/ha 0,8 - 1,3 l/ha OVP 42
		jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi	Galbenon	1 - 3 l/ha 42
	Formiranje redova	plamenjača	Crux + Vokal C	0,5 l/ha 1 l/ha 7 7
		krompirova zlatica	Tonus	0,25 kg/ha 14
	Zatvaranje redova	plamenjača, crna pegavost	Fuzija plus + *Laguna	2 l/ha 0,06 l/ha 7 14
		krompirova zlatica		
	Početak cvetanja	plamenjača, crna pegavost	Magnetic + Sekvenca	1,5 l/ha 0,5 l/ha 7 14
		krompirova zlatica	Traper	0,05 - 0,1 l/ha 14
	Puno cvetanje	plamenjača, crna pegavost	Fuzija plus + Sekvenca	2 l/ha 0,5 l/ha 7 14
	Precvetavanje	plamenjača, crna pegavost	Magnetic + Sekvenca	1,5 l/ha 0,5 l/ha 7 14
		krompirova zlatica	Traper	0,05 - 0,1 l/ha 14
	Nalivanje krtola	plamenjača, krompirova zlatica, biljne vaši	Alijansa plus + Kardinal + Polux	2,5 kg/ha 0,4 l/ha 0,3 - 0,5 l/ha 14 7 7
	Fiziološka zrelost	plamenjača	Kardinal + Promesa	0,4 l/ha 0,75 l/ha 7 14
		desikacija**	Kabuki 2,5 EC	0,8 l/ha OVP

* U procesu registracije

**Kod semenskog krompira se obavlja u fazi nalivanja krtola, kada u ukupnom prinosu dominiraju krtole semenske frakcije
Program zaštite nije prilagođen proizvodnji mladog krompira

▶ Program ishrane krompira

	Vreme primene	Folijarno (preko lista)	
		Proizvod	Količina primene
	Početak nicanja	Solugal Start NPK 11-40-11+ME + Fertigal Eklomaks	3 kg/ha 1 l/ha
	Formiranje redova	Solugal Vegetative NPK 24-10-10+2MgO+ME + Fertigal Eklomaks	3 kg/ha 2 l/ha
	Zatvaranje redova	Foligal Feed Mag 500 + Activeg Gold	1 l/ha 2 l/ha
	Početak cvetanja	Solugal Ripe NPK 13-5-30+2MgO+3CaO+ME	3 kg/ha
	Puno cvetanje	Solugal Universal NPK 20-20-20+ME	3-5 kg/ha
	Precvetavanje	Solugal Ripe NPK 13-5-30+2MgO+3CaO+ME	3-5 kg/ha


GALITION® ULTRA





► Zaštita paradajza u plasteniku



Faza razvoja/Vreme primene	Namena	Preparat	Količina/ koncentracija primene	Karenca (dani)	
	Pre rasađivanja	zemljišni patogeni i bolesti poleganja rasada	preparat na bazi a.m. propamokarb	15 - 25 ml/10 l zalivanjem	
		zemljišne štetočine	Galition ultra	12 - 15 kg/ha	OVP
	Rasađene biljke, faza porasta 6-8 listova	crna pegavost, plamenjača	Akord + Magnetic +	0,75 l/ha	21
		biljne vaši	Talent	1,2-1,6 l/ha	7
				0,06 - 0,1 kg/ha	1
	Po potrebi	plamenjača	Vokal C + Bakarni oksihlorid 50	0,8-1 l/ha	7
				0,5%	14
	1-2 nedelje po rasađivanju	plamenjača, crna pegavost	Vokal C + Promesa +	0,8-1 l/ha	7
		biljne vaši	Talent +	0,75 l/ha	3
		fitofagne grinje	*Kentaur	0,06 - 0,1 kg/ha	1
				0.05%	3
	Posle 7 - 10 dana	crna pegavost	Sekvenca +	0,5 l/ha	7
		plamenjača	Magnetic +	1,2 - 1,6 l/ha	7
		siva trulež	Pehar +	1,5 - 2 l/ha	14
		paradajzov moljac, bela leptirasta vaš	Triton +	1,5 - 2 l/ha	3
			Ecothrin 5 SC	0,3 - 1 l/ha	2
	Intenzivan porast i zametanje plodova	plamenjača	Magnetic +	1,2 - 1,6 l/ha	7
		siva trulež	Pehar +	1,5 - 2 l/ha	14
		fitofagne grinje	Abastate + Nu-Film 17	0,05% + 0,15%	3
		leptiraste vaši, paradajzov moljac	Ecothrin 5 SC	0,3 - 1 l/ha	2
	Zaštita do prve berbe (vodeći računa o karenci)	plamenjača	Vokal C +	0,8 - 1 l/ha	7
		siva trulež	Crux +	0,5 l/ha	3
		pamukova sojica, paradajzov moljac	*Atlas flow +	0,8 - 1 l/ha	3
			*Laguna	0,14 - 0,2 l/ha	1
		Fitofagne grinje	*Adut	1 - 1,2 l/ha	3
	Zaštita između berbi (vodeći računa o karenci)	plamenjača, crna pegavost	Promesa + Crux +	0,75 l/ha	3
			Harpun +	0,5 l/ha	3
		bela leptirasta vaš, biljne vaši	Polux	0,075%	3
				0.05%	7
	Suzbijanje insekata između berbi (vodeći računa o karenci)	pamukova sojica, paradajzov moljac bela leptirasta vaš, trips	Triton + Limocide	1,5 - 2 l/ha	3
			2 - 4 l/ha	1	

* U procesu registracije



► Zaštita paradajza na otvorenom



Faza razvoja/Vreme primene	Namena	Preparat	Količina/ koncentracija primene	Karenca (dani)
	Pre rasađivanja	zemljišni patogeni i bolesti poleganja rasada	preparat na bazi a.m. propamokarb	15 - 25 ml/10 l zalivanjem
		zemljišne štetočine	Galition ultra	12 - 15 kg/ha
		jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi	Zanat	4-5 l/ha
	Rasađene biljke, faza porasta 6-8 listova	plamenjača, crna pegavost	Akord + Fuzija plus + Talent	0,75 l/ha 2 l/ha 0,06 - 0,1 kg/ha
		biljne vaši		1
	Po potrebi	plamenjača	Vokal C + Bakarni oksihlorid 50	0,8-1 l/ha 0,5%
				7 14
	1-2 nedelje po rasađivanju	uskolisni korovi	Rafal 120	1 - 2 l/ha
		plamenjača, crna pegavost	Fuzija plus + Promesa + Talent	2 l/ha 0,75 l/ha 0,06 - 0,1 kg/ha
		biljne vaši		7 3 1
	Posle 7 - 10 dana	crna pegavost	Sekvenca + Magnetic + Pehar + Cipkord 20 EC	0,5 l/ha 1,2-1,6 l/ha 1,5 - 2 l/ha 0,02% - 0,03%
		plamenjača		7
		siva trulež		7
		bela leptirasta vaš		14 14
	Intenzivan porast i zamatanje plodova	plamenjača	Magnetic + Pehar + Triton	1,2-1,6 l/ha 1,5 - 2 l/ha 1,5 - 2 l/ha
		siva trulež		7
		paradajzov moljac, sovice		14
		bela leptirasta vaš, trips	Limocide	3 1
	Zaštita do prve berbe (vodeći računa o karenci)	plamenjača	Vokal C + Crux + Polux + *Laguna	0,8-1 l/ha 0,5 l/ha 0,05% 0,14 - 0,2 l/ha
		zelena vaš, bela leptirasta vaš		7
		pamukova soвица		1
	Zaštita između berbi (vodeći računa o karenci)	plamenjača, crna pegavost	Promesa + Crux + *Atlas flow + preparat na bazi a.m. piridaben	0,75 l/ha 0,5 l/ha 0,8-1 l/ha 0,5 l/ha
		siva trulež		3 3 3
		fitofagne grinje		
	Suzbijanje insekata između berbi (vodeći računa o karenci)	pamukova soвица, paradajzov moljac	Triton + Limocide	1,5 - 2 l/ha 2 - 4 l/ha
		bela leptirasta vaš, trips		3 1

* U procesu registracije



Pravi put u zaštiti bilja

▶ Program ishrane paradajza

Vreme primene	Fertirigacija (preko sistema kap po kap)			Folijarno (preko lista)	
	Proizvod	Količina primene	Primena	Proizvod	Količina/koncentracija primene
Posle rasađivanja	Solugal Start NPK 11-40-11+ME	0,5-1 g/biljci	dva puta u razmaku 5-7 dana	Fertigal Cu Bactoclean	0,2%
				Activeg Gold	1-3 l/ha
				Fertigal Eklomaks	0,2%
15-20 dana posle rasađivanja	Solugal Vegetative NPK 24-10-10+2MgO+ME	1-2 g/biljci	jednom	Fertigal Eklomaks	2 l/ha
				Foligal Feed Bor 150	0,1%
Formiranje druge cvetne grane	Solugal Universal NPK 20-20-20+ME	1-2 g/biljci	jednom do dva puta u razmaku 4-5 dana	Fertigal Cu Bactoclean	0,2%
				Fertigal CaB Organo	0,25%
Formiranje plodova	Solugal Ripe NPK 13-5-30+2MgO+3CaO+ME	1-2 g/biljci	dva puta nedeljno	Foligal Feed CalMax	0,3%
	Nutrivit Potassium Nitrate HG	1 g/biljci			
Početak berbe	Solugal Ripe NPK 13-5-30+2MgO+3CaO+ME ili Nutrivit Potassium Nitrate HG	2-3 g/biljci	dva puta nedeljno	Activeg Vegetative	0,25%
		2-3 g/biljci		Fertigal Silika	0,25%
		2-3 g/biljci		Fertigal CaB Organo	0,25%
Intenzivna berba	Solugal Ripe NPK 13-5-30+2MgO+3CaO+ME ili Kalasul 0-0-50 + 46 SO₃	2-3 g/biljci	dva puta nedeljno	Murtonik 19-9-27	0,25%
		2-3 g/biljci	po potrebi tokom sazrevanja	Fertigal Silika	0,25%
		2-3 g/biljci		Foligal Feed CalMax	0,25%

Nutrivit Calcium Nitrate HG pustiti kroz sistem kap po kap (naročito na zemljištima sa deficitom kalcijuma) najmanje jednom na 7-10 dana, od formiranja druge cvetne grane pa do kraja berbe 0,5-2 g/biljci

Nutrivit Magnesium Sulphate HG pustiti kroz sistem kap po kap (naročito na zemljištima sa deficitom magnezijuma) nekoliko puta od faze vegetativnog rasta do formiranja plodova, 0,2-0,5 g/biljci.



Preparati za organsku proizvodnju

Limocide

aktivna supstanca: **ulje pomorandže**

Limocide je proizvod koji se koristi kao insekticid, akaricid, i kao fungicid (za pojedine prouzrokovane bolesti).



Ecothrin[®] 5 SC

aktivna supstanca: Piretrin

**Nesistemični insekticid sa
kontaktnim i digestivnim
delovanjem**





► Zaštita paprike



Faza razvoja/Vreme primene	Namena	Preparat	Količina/ koncentracija primene	Karenca (dani)	
	Zaštita rasada	zemljišni patogeni	Balb	10 - 25 ml/10 l vode zalivanjem	35
		bakterioze	*Galoksid	1,4 - 1,8 kg/ha	21
		biljne vaši	Talent	0,12 - 0,14 kg/ha	5
	Pre rasađivanja	jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi	**Zanat	5 l/ha	63
	Posle rasađivanja (biljke sa 6-8 listova)	crna pegavost	Sekvenca +	0,5 l/ha	7
		tripsi	preparat na bazi a.s. spinosad +	0,4 l/ha	
		biljne vaši	Tonus	0,25 -0,4 kg/ha	14
	1-2 nedelje nakon rasađivanja	uskolisni korovi	Rafal 120	0,8 - 2 l/ha	30
		plamenjača, bakterioze	*Galoksid	1,4 - 1,8 kg/ha	21
		biljne vaši	Talent	0,12 - 0,14 kg/ha	5
	Početak formiranja plodova	crna pegavost	Sekvenca +	0,5 l/ha	7
		siva trulež	Pehar +	1,5 - 2 l/ha	14
		zelena stenica	Polux +	0,5 l/ha	3
		tripsi	preparat na bazi a.s. spinosad	0,4 l/ha	
	Intenzivan porast plodova	antraknoza	Promesa +	0,75 l/ha	3
		siva trulež	Pehar +	1,5 - 2 l/ha	14
	pamukova sovica	Triton	1,5 - 2 l/ha	3	
	Zaštita između berbi vodeći računa o karenci	antraknoza	Promesa +	0,75 l/ha	3
		siva trulež	*Atlas flow +	0,8 - 1 l/ha	7
		zelena stenica	Polux	0,5 l/ha	3
		pamukova sovica	Triton	1,5 - 2 l/ha	3

* U toku je proces registracije

** **Zanat** ne primenjivati u proizvodnji industrijske paprike direktnom setvom

► Program ishrane paprike

Vreme primene	Fertirigacija (preko sistema kap po kap)			Folijarno (preko lista)	
	Proizvod	Količina primene	Primena	Proizvod	Količina/koncentracija primene
5-7 dana posle rasađivanja	Fertigal Eklomaks	2-3 l/ha	jednom	Fertigal Cu Bactoclean	0,2%
10 dana posle rasađivanja	Solugal Start NPK 11-40-11+ME	0,5-1 g/biljci	dva puta u razmaku 5-7 dana	Fitopin	100 ml/ha
Vegetativni porast	Solugal Vegetative NPK 24-10-10+2MgO+ME	1-2 g/biljci	više puta po potrebi	Fertigal Eklomaks	0,25%
Formiranje plodova	Solugal Universal NPK 20-20-20+ME	1-2 g/biljci	jednom do dva puta (na 7 dana)	Activeg Gold	1-3 l/ha
				Fertigal Cu Bactoclean	2 l/ha
Intenzivan rast plodova	Solugal Ripe NPK 13-5-30+2MgO+3CaO+ME	1-2 g/biljci	dva puta nedeljno	Fertigal CaB Organo	0,3%
				Activeg Vegetative	3-5 l/ha
				Fertigal Silika	0,25%
Intenzivna berba	Nutrivit Potassium Nitrate HG ili Kalasul 0-0-56 + 46 SO₃	2-3 g/biljci	dva puta nedeljno	Foligal Feed CalMax	0,3%
				Murtonik 19-9-29	0,2%
				Fertigal CaB Organo	0,3%

Nutrivit Calcium Nitrate HG pustiti kroz sistem kap po kap (naročito na zemljištima sa deficitom kalcijuma) najmanje jednom na 7-10 dana, od početka formiranja plodova pa do kraja berbe 0,5-2 g/biljci

Nutrivit Magnesium Sulphate HG pustiti kroz sistem kap po kap (naročito na zemljištima sa deficitom magnezijuma) nekoliko puta od faze vegetativnog porasta do formiranja plodova u količini 0,2-0,5 g/biljci



► Zaštita crnog luka



Faza razvoja/Vreme primene	Namena	Preparat	Količina primene	Karenca (dani)
	Istovremeno sa setvom	zemljišne štetočine	preparat na bazi a.s. teflutrin	7 - 10 kg/ha
	Pre nicanja	jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi	Zanat	5 l/ha 63
	2- 3 lista	plamenjača, crna pegavost luka	***Galoksid Flow + Karika	2,4 - 3 l/ha 14
		lukova muva		0,4 - 0,5 l/ha
	3-6 lista	jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi	**Lontrel 100 ili **Pikogal plus	0,8 - 1,2 l/ha 42 0,3 - 0,5 l/ha 42
		uskolisni korovi	Rafal 120 ili Spektrum	0,8 - 2 l/ha 30 0,8 - 1,3 l/ha 49
		širokolisni korovi	*Bonaca EC	0,4 - 1 l/ha OVP
		plamenjača	Magnetic + Karika	1,6 l/ha 7
		lukova muva		0,4 - 0,5 l/ha 14
	Početak formiranja glavice	plamenjača, siva trulež tripsi, biljne vaši	Magnetic + ***Atlas flow + preparat na bazi a.m. spinosad + preparat na bazi a.m. deltametrin	1,6 l/ha 7 1 - 1,2 l/ha 14 0,4 - 0,5 l/ha 0,5 l/ha
	Intenzivan porast glavice	siva trulež, plamenjača, lisna pegavost lukova muva, biljne vaši	preparat na bazi a.s. fluazinam + ***Atlas flow + Tonus	0,4 l/ha 14 1 - 1,2 l/ha 0,25 kg/ha 14

*Ukoliko se radi dozama većim od 0,5 l/ha preporučuje se split aplikacija

**U jesen iste godine i u proleće naredne godine ne smeju se sejati lucerka, salata, grašak i mrkva

U slučaju primene herbicida koji mogu izazvati privremena oštećenja luka (**Lontrel 100**, **Pikogal plus** i **Bonaca EC**) potrebno je izvršiti primenu 2 dana pre ili 2 dana posle padavina

***U toku je proces registracije

▶ Program ishrane crnog luka

Vreme primene	Fertirigacija (preko sistema kap po kap)			Folijarno (preko lista)	
	Proizvod	Količina primene	Primena	Proizvod	Količina/koncentracija primene
Faza 3-4 lista	Solugal Start NPK 11-40-11+ME	25 kg/ha	jednom	Fertigal Eklomaks	0,25%
				Fitopin	100 ml/ha
Faza 5-6 lista	Solugal Vegetative NPK 24-10-10+2MgO+ME	25-30 kg/ha	dva puta u intervalu 7-10 dana	Activeg Vegetative	3-5 l/ha
				Foligal Feed Cink 700	1 l/ha
Formiranje glavice	Solugal Ripe NPK 13-5-30+2MgO+3CaO+ME	25 kg/ha	dva puta nedeljno	Chopin evolution	3-5 l/ha
30 dana nakon prethodne fertirigacije	Nutivit Potassium Nitrate HG ili Kalasul 0-0-50 + 46 SO₃	25 -30 kg/ha	dva puta nedeljno, 3-4 puta	Foligal Feed CalMax	0,25%
			2-3 puta	Kalasul 0-0-50 + 46 SO₃	3 - 5 kg/ha

Nutrivit Calcium Nitrate HG pustiti kroz sistem kap po kap (naročito na zemljištima sa deficitom kalcijuma) najmanje jednom na 7-10 dana, nakon početka formiranja glavice u količini 25 kg/ha

Nutrivit Magnesium Sulphate HG pustiti kroz sistem kap po kap (naročito na zemljištima sa deficitom magnezijuma) nekoliko puta od faze intenzivnog porasta glavice u količini 10-15 kg/ha



► Zaštita lubenice i dinje



Faza razvoja/Vreme primene	Namena	Preparat	Količina/ koncentracija primene	Karenca (dani)	
	Pre rasađivanja	plamenjača	Balb	0,15%	14
	Suzbijanje korova posle rasađivanja	uskoliski korovi	Rafal 120	0,8 - 2 l/ha	30
	Posle rasađivanja	plamenjača	Legat SP +	0,25%-0,37%	4
		štetni insekti	Tonus	0,125 kg/ha	3
		bakteriozna mrljavost plodova	preparat na bazi a.s. bakarni oksihlorid	2 kg/ha	
	Formiranje vreže	plamenjača	Promesa	0,75 l/ha	4
		biljne vaši	preparat na bazi a.s. flonikamid	0,1 kg/ha	
	Formiranje plodova	plamenjača	Magnetic +	1,4 - 1,6 l/ha	3
		bela trulež, gumozna plamenjača, antraknoza	Atlas +	1 kg/ha	3
		biljne vaši	Kozak	0,25 l/ha	3
	Zaštita između berbi, po potrebi, u zavisnosti od vremenskih uslova (vodeći računa o karenci)	plamenjača, krastavost plodova, gumozna plamenjača, bela trulež, antraknoza	Promesa +	0,75 l/ha	4
			Atlas	1 kg/ha	3

Magnetic

Visoka efikasnost u suzbijanju prouzrokovaca plamenjače
i kratka karenca u povrtarskim kulturama!



▶ Program ishrane lubenice i dinje

Vreme primene	Fertirigacija (preko sistema kap po kap)			Folijarno (preko lista)	
	Proizvod	Količina primene	Primena	Proizvod	Količina/koncentracija primene
Posle rasađivanja 5-7 dana	Fertigal Eklomaks	3 l/ha	jednom	Fitopin	100 ml/ha
10 dana posle rasađivanja	Solugal Start NPK 11-40-11 + ME	1-2 g/biljci	dva puta u razmaku 5-7 dana	Activeg Gold	1-3 l/ha
Vegetativni porast	Solugal Vegetative 24-10-10 + 2MgO + ME	1-2 g/biljci	jednom do dva puta	Foligal Feed Bor 150	0,1%
Formiranje plodova	Solugal Universal NPK 20-20-20 + ME	1-2 g/biljci	jednom do dva puta (na 7 dana)	Fertigal CaB Organo	0,25%
				Fertigal Silika	0,25%
Intenzivan rast plodova	Solugal Ripe NPK 13-5-30+2MgO+3CaO+ME	2-3 g/biljci	jednom nedeljno	Activeg Vegetative	3-5 l/ha
				Foligal Feed CalMax	0,25%
Plod veličine 2/3 pa do kraja berbe	Nutrivit Potassium Nitrate HG	4-5 g/biljci	dva puta nedeljno, po potrebi tokom sazrevanja	Activeg Gold	1-3 l/ha
				Foligal Feed Bor 150	0,15%
				Fertigal CaB Organo	0,25%

Nutrivit Calcium Nitrate HG pustiti kroz sistem kap po kap (naročito na zemljištima sa deficitom kalcijuma) najmanje jednom na 7-10 dana, od početka formiranja plodova pa do kraja berbe 0,5-2 g/biljci.

Nutrivit Magnesium Sulphate HG pustiti kroz sistem kap po kap (naročito na zemljištima sa deficitom magnezijuma) nekoliko puta od faze vegetativnog porasta do formiranja plodova u količini 0,2-0,5 g/biljci.



► Zaštita tikvice, tikve i bundeve



Faza razvoja/Vreme primene	Namena	Preparat	Količina/ koncentracija primene	Karenca (dani)	
	10-15 dana nakon rasađivanja/ nicanja useva	plamenjača biljne vaši	Balb + Polux	0,15% 0,03 - 0,05%	14 3
	10 dana nakon prethodnog	plamenjača, pepelnica	Magnetic + Akord	1,4 - 1,6 l/ha 0,05%	3 7
	10 dana nakon prethodnog	plamenjača, siva trulež	Promesa + Atlas + Tonus	0,75 l/ha 1 kg/ha 0,125 kg/ha	4 3 3
		štetni insekti			
		bela leptirasta vaš	Limocide	2 l/ha	1
	Zaštita između berbi, po potrebi, u zavisnosti od vremenskih uslova (vodeći računa o karenci)	plamenjača	Legat SP + Kozak	0,25 % - 0,37 %	4
		biljne vaši		0,25 l/ha	3
		pepelnica	Limocide	4 l/ha	1

► Program ishrane tikvice, tikve i bundeve

Vreme primene	Fertirigacija (preko sistema kap po kap)			Folijarno (preko lista)	
	Proizvod	Količina primene	Primena	Proizvod	Količina/ koncentracija primene
Posle rasađivanja	Solueveg Start NPK 11-40-11+ME	25 kg/ha	dva puta u razmaku 5-7 dana	Fertigal Eklomaks	2 l/ha
Vegetativni porast	Solugal Vegetative 24-10-10 + 2MgO + ME	25 kg/ha	dva puta u razmaku 5-7 dana	Foligal Feed Bor 150	0,1%
Intenzivan rast plodova	Solugal Ripe NPK 13-5-30 + 2MgO + 3CaO + ME ili	25 kg/ha	dva puta u razmaku od 10 dana	Fertigal CaB Organo	0,25%
	Nutrivit Potassium Nitrate HG	25 kg/ha		Murtonik 19-9-27	2-3 kg/ha

Nutrivit Calcium Nitrate HG pustiti kroz sistem kap po kap (naročito na zemljištima sa deficitom kalcijuma) najmanje jednom na 7-10 dana, od početka formiranja plodova 0,5-2 g/biljci.

Nutrivit Magnesium Sulphate HG pustiti kroz sistem kap po kap (naročito na zemljištima sa deficitom magnezijuma) nekoliko puta od faze vegetativnog porasta do formiranja plodova u količini 0,2-0,5 g/biljci.

► Zaštita graška, boranije i pasulja



Faza razvoja/Vreme primene		Namena	Preparat	Količina primene	Karenca (dani)
	Posle setve, pre nicanja	jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi	Zanat	5 l/ha	grašak 63, boranija i pasulj OVP
	Posle nicanja biljaka 2-3 troliske	uskolisni korovi	Rafal 120	1,2 - 2 l/ha	30
		širokolisni korovi	Galbenon + Kvazar	1,5 - 2 l/ha 0,3 - 0,5 l/ha	grašak i pasulj 42, boranija 30 35
	Po potrebi	bakterioze	preparat na bazi a.s. bakarni oksihlorid	2 kg/ha	
	Pre cvetanja	plamenjača	preparat na bazi a.s. fosecil AI + *Talent	2,5 kg/ha	14
		biljne vaši		0,14 kg/ha	
	Precvetavanje	antraknoza	Promesa + Tonus	1 l/ha	14
		biljne vaši, graškov žižak		0,25 kg/ha	14

* U toku je proces registracije

► Program ishrane graška, boranije i pasulja

Vreme primene	Folijarno (preko lista)	
	Proizvod	Količina primene
Pre cvetanja	Activeg Gold	1 - 3 l/ha
	Fitopin	100 ml/ha
Precvetavanje	Activeg Vegetative	1 - 3 l/ha
	Foligal Feed Mag 500	2 - 4 l/ha



► Zaštita zelene salate



Faza razvoja/Vreme primene	Namena	Preparat	Količina primene/koncentracija	Karenca (dani)	
	Pre rasađivanja	bolesti poleanja rasada	preparat na bazi a.s. propamokarb	15 ml/10 l vode zalivanjem	
	Posle rasađivanja	plamenjača	preparat na bazi a.s. propamokarb + fluopikolid + Promesa + Kozak	1,2 - 1,6 l/ha 1 l/ha 0,15 - 0,2 l/ha	7 7
		biljne vaši, sovice			
	Rast i razvoj rozete	plamenjača, siva i bela trulež	preparat na bazi a.s. propamokarb + fluopikolid + Atlas + Polux	1,2 - 1,6 l/ha 0,6 kg/ha 0,05%	7 7
		biljne vaši, lisne sovice			
		plamenjača, pepelnica	Limocide	3 l/ha	1
	Formiranje glavice	plamenjača	Promesa + preparat na bazi a.s. spinosad	1 l/ha 0,3 l/ha	7
		tripsi			
		plamenjača, pepelnica	Limocide	3 l/ha	1
	Po potrebi	siva i bela trulež biljne vaši, sovice	Atlas + Kozak	0,6 kg/ha 0,15 - 0,2 l/ha	7 7

► Program ishrane zelene salate

Vreme primene	Fertirigacija (preko sistema kap po kap)			Folijarno (preko lista)	
	Proizvod	Količina primene	Primena	Proizvod	Količina/koncentracija primene
Posle rasađivanja	Solugal Start NPK 11-40-11 + ME	25 kg/ha	dva puta u razmaku 5-7 dana	Activeg Gold + Fitopin	1 - 2 l/ha 100 ml/ha
Vegetativni porast	Solugal Vegetative NPK 24-10-10+2MgO+ME	25-30 kg/ha	više puta po potrebi	Fertigal CaB Organo	2 l/ha
Formiranje glavice	Solugal Ripe NPK 13-5-30+2MgO+3CaO+ME	30 kg/ha	dva puta u razmaku 7 do 10 dana	Foligal Feed Mag 500	2 l/ha
	Nutrivit Calcium Nitrate HG	0,5 g/biljci	jednom nedeljno	Foligal Feed CalMax Fertigal Silika	3 l/ha 1 l/ha

► Zaštita mrkve, celera i peršuna



Faza razvoja/Vreme primene		Namena	Preparat	Količina primene	Karenca (dani)
	Istovremeno sa setvom	zemljišne štetočine	Tekton	7 - 10 kg/ha	OVP
	Posle setve, a pre nicanja (pre rasađivanja celera)	zaštita rasada (celer)	preparat na bazi a.s. propamokarb	15 - 20 ml/10 l vode zalivanjem	
		jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi	Zanat	3 - 3,5 l/ha	60
	Faza 3-4 lista	crna pegavost	*Duplex pro + Polux	0,8-1l/ha	14
		mrkvina muva		0,3 l/ha	7
	Intenzivan porast	uskolisni korovi	Rafal 120	1,2 - 1,5 l/ha	30
		crna pegavost	Promesa + Akord	1 l/ha	7
		pepelnica		0,75 - 1 l/ha	21
		pepelnica	Limocide	1,8 - 2,4 l/ha	1
	10-15 dana nakon prethodnog	pepelnica, crna pegavost	Promesa + Sekvenca	1 l/ha	7
			0,5 l/ha	14	
	Po potrebi	pepelnica	Akord	0,75 - 1 l/ha	21
		pepelnica	Limocide	1,8- 2,4 l/ha	1

* U toku je proces registracije

► Program ishrane mrkve, celera i peršuna

Vreme primene	Fertirigacija (preko sistema kap po kap)			Folijarno (preko lista)	
	Proizvod	Količina primene	Primena	Proizvod	Količina/koncentracija primene
Početak vegetacije	Solugal Start NPK 11-40-11+ME	25 kg/ha	jednom	Fertigal Eklomaks	2-3 l/ha
Intenzivan porast	Solugal Vegetative NPK 24-10-10+2MgO+ME	25 kg/ha	jednom	Foligal Feed Bor 150	3 l/ha
				Fertigal Eklomaks	2-3 l/ha
				Foligal Feed Man 500	1 l/ha
Početak debljanja korena	Solugal Ripe NPK 13-5-30+2MgO+3CaO+ME	30 kg/ha	jednom do dva puta na 10-15 dana	Foligal Feed CalMax	0,25%
Formiranje glavice	Nutivit Potassium Nitrate HG	30 kg/ha	dva do tri puta	Murtonik 19-9-27	2-3 kg/ha

Nutrivit Calcium Nitrate HG pustiti kroz sistem kap po kap (naročito na zemljištima sa deficitom kalcijuma), 1-2 puta od faze intenzivnog porasta u količini 25-50 kg/ha.

Nutrivit Magnesium Sulphate HG pustiti kroz sistem kap po kap (naročito na zemljištima sa deficitom magnezijuma), 1-2 puta od faze intenzivnog porasta u količini 15-25 kg/ha.



► Zaštita krastavca



Faza razvoja/Vreme primene	Namena	Preparat	Količina/ koncentracija primene	Karenca (dani)	
	Pre rasađivanja	plamenjača	Balb	15 ml na 10 l vode zalivanjem	14
	Posle rasađivanja	uskolisni korovi	Rafal 120	0,8 - 2 l/ha	30
		plamenjača	*Galoksid flow + Polux	2,4 -3 l/ha	5
		vaši, bela leptirasta vaš		0,05%	7
	Cvetanje i zametanje plodova	plamenjača	Magnetic + Traper	1,2 - 1,6 l/ha	3
		tripsi		0,3 - 0,4 l/ha	3
		plamenjača	Legat	0,25 - 0,37%	4
	Pred početak berbe, voditi računa o karenci	bela leptirasta vaš, tripsi, pepelnica	Limocide	4 - 8 l/ha	1
		plamenjača	Promesa + Magnetic + preparat na bazi a.s. flonikamid	0,75 l/ha	4
		vaši, bela leptirasta vaš		1,2 - 1,6 l/ha	3
		grinje		preparat na bazi a.s. acekvinocil	0,6 - 1,2 l/ha
	Zaštita između berbi, voditi računa o karenci	bela leptirasta vaš, tripsi, pepelnica	Limocide	4 - 8 l/ha	1
		plamenjača	Promesa + Crux	0,75l/ha	4
				0,5 l/ha	3

* U toku je proces registracije

► Program ishrane krastavca

Vreme primene	Fertirigacija (preko sistema kap po kap)			Folijarno (preko lista)	
	Proizvod	Količina primene	Primena	Proizvod	Količina/koncentracija primene
Nakon rasađivanja	Fertigal Eklomaks	2-3 l/ha	jednom	Fitopin	100 ml/ha
10 dana nakon rasađivanja	Solugal Start NPK 11-40-11 + ME	0,5-1 g/biljci	dva puta u razmaku 5-7 dana	Activeg Vegetative + Fertigal Eklomaks	1 l/ha 2 l/ha
Vegetativni porast i početak cvetanja	Solugal Vegetative NPK 24-10-10+2MgO+ME	1-2 g/biljci	jednom do dva puta	Activeg Vegetative	2 l/ha
	Nutrivit Calcium Nitrate HG	1 g/biljci	jednom nedeljno	Foligal Feed Bor 150	1 l/ha
Formiranje plodova	Solugal Universal NPK 20-20-20+ME	1 - 2 g/biljci	jednom do dva puta (na 7 dana)	Activeg Gold + Fertigal CaB Organo	2 l/ha
	Nutrivit Calcium Nitrate HG	1 g/biljci	jednom nedeljno		3 l/ha
Početak berbe	Solugal Ripe NPK 13-5-30 + 2MgO + 3CaO + ME ili Nutrivit Potassium Nitrate HG	1 - 2 g/biljci	dva puta nedeljno	Activeg Gold + Foligal Feed Mag 500	2 l/ha 1 l/ha
				Fertigal CaB Organo	3 l/ha
Tokom berbe	Nutrivit Potassium Nitrate HG	1 - 2 g/biljci	dva puta nedeljno	Activeg Gold + Foligal Feed CalMax	2 l/ha 3 l/ha

Nutrivit Calcium Nitrate HG pustiti kroz sistem kap po kap (naročito na zemljištima sa deficitom kalcijuma) najmanje jednom na 7-10 dana, nakon sadnje do Intenzivne berbe, 0,5-2 g/biljci.

Nutrivit Magnesium Sulphate HG pustiti kroz sistem kap po kap (naročito na zemljištima sa deficitom magnezijuma) nekoliko puta od faze vegetativnog rasta do formiranja plodova, 0,2-0,5 g/biljci.



► Zaštita kupusa



Faza razvoja/Vreme primene	Namena	Preparat	Količina/ koncentracija primene	Karenca (dani)
	Pre rasađivanja	bolesti poleganja rasada	preparat na bazi a.s. propamokarb	15 - 20 ml / 10 l vode zalivanjem
		zemljišne štetočine	preparat na bazi a.s. teflutrin	5 - 7 kg/ha
		uskolisni i širokolisni korovi	Zanat	4 - 5 l/ha 63
	Posle rasađivanja	plamenjača, bakterioze	*Galoksid flow	1,8 - 2,4 l/ha 7
		kupusar, lisne sovice	Cipkord 20 EC	0,15 - 0,3 l/ha 28
		kupusni moljac	Laguna	0,14 - 0,2 l/ha 7
	8 - 10 dana po rasađivanju	uskolisni korovi	Rafal 120	0,8 - 1,2 l/ha 30
		kupusna vaš, kupusni moljac	Triton + Tonus	1,5 l/ha 0,4 kg/ha 3 14
		plamenjača	*Magnetic	1,2 - 1,6 l/ha 14
	Formiranje rozete	plamenjača	*Magnetic +	1,2 - 1,6 l/ha 14
		lisne sovice	Kozak	0,2 l/ha 14
	Formiranje glavice	plamenjača, bakterioze	*Galoksid flow	1,8 - 2,4 l/ha 7
		sovice	Kozak	0,2 l/ha 14
	Porast glavica	plamenjača, crna pegavost	preparat na bazi a.s. azoksistobin	1 l/ha
		kupusni moljac	Triton	1,5 l/ha 3

* U toku je proces registracije

► Program ishrane kupusa

Vreme primene	Fertirigacija (preko sistema kap po kap)			Folijarno (preko lista)	
	Proizvod	Količina primene	Primena	Proizvod	Količina/ koncentracija primene
Posle rasađivanja	Solugal Start NPK 11-40-11+ME	25 kg/ha	jednom do dva puta u intervalu 7-10 dana	Fertigal Eklomaks	0,25%
Faza 4-6 listova				Foligal Feed Man 500	1 l/ha
Intenzivan porast	Solugal Vegetative NPK 24-10-10 +2MgO+ ME	25 kg/ha	jednom do dva puta	Chopin Evolution	3-5 l/ha
				Foligal Feed Bor 150	0,1%
Formiranje glavice	Solugal Ripe NPK 13-5-30+2MgO+3CaO+ME	30 kg/ha	dva puta u intervalu 10-15 dana	Chopin Evolution	3-5 l/ha
	Nutrivit Potassium Nitrate HG	30 kg/ha			

Nutrivit Calcium Nitrate HG pustiti kroz sistem kap po kap (naročito na zemljištima sa deficitom kalcijuma) najmanje jednom na 7-10 dana, nakon rasađivanja do formiranja glavice 25 kg/ha.

Nutrivit Magnesium Suphate HG pustiti kroz sistem kap po kap (naročito na zemljištima sa deficitom magnezijuma) nekoliko puta od faze formiranja rozete do formiranja glavice 10 kg/ha.

Foligal FEED

Super

Bor 150

Mag 500

Man 500

Cink 700

CalPit

CalMax



**Za bogat
i kvalitetan rod!**

SOLUGAL



Za primenu u:

**Visoko
kvalitetna
vodotopiva
đubriva!!!**

RATARSTVU



POVRTARSTVU



VOĆARSTVU





► Zaštita jabuke



Faza razvoja/Vreme primene		Namena	Preparat	Koncentracija primene	Karenca (dani)
	Bubrenje pupoljaka	prezimljavajuće forme prouzrokovaca bolesti i štetnih insekata	Bakarni oksihlorid 50 + Galmin + Cipkord 20 EC	0,5%	OVP
				2 - 3%	OVP
				0,015 - 0,02%	28
			ili		
			Plavo ulje + Cipkord 20 EC	2 - 3%	OVP
			0,015 - 0,02%	28	
	Pucanje pupoljaka	čađava pegavost lista	Cuprozin 35 WP	0,35%	OVP
	Mišije uši	čađava pegavost lista	Diziram 76 WG ili Acustic + Lunar	0,25%	21
				0,15%	21
		pepelnica		0,02%	21
	Zeleni buketići	čađava pegavost lista	Diziram 76 WG + Pehar + Avangard (NOVO) + Cipkord 20 EC	0,25%	21
				0,1%	28
		pepelnica		0,3%	14
		štetni insekti		0,015 - 0,02%	28
	Roze pupoljak	čađava pegavost lista	Acustic + Neon + Lunar + Talent	0,15%	21
				0,05 - 0,07%	28
		pepelnica		0,02%	21
		biljne vaši		0,014%	21
	Beli baloni	čađava pegavost lista i pepelnica	Galileo + Pehar + Insajder	0,075%	35
				0,1%	28
				0,03 - 0,05%	28
	Od roze pupoljaka do faze intenzivnog porasta mladara po potrebi	bakteriozna plamenjača jabučastih voćaka	Legat SP	0,4 - 0,45%	30
	Cvetanje	čađava pegavost lista	Galileo + Neon	0,075%	35
				0,05 - 0,07%	28
	Precvetavanje	čađava pegavost lista i krastavost plodova	Kardinal + Belatrix + Karika	0,075%	28
		pepelnica		0,015%	14
		biljne vaši		0,06-0,1%	28
	Prvo posle precvetavanja	čađava pegavost lista i krastavost plodova, pepelnica	Kardinal + Sekvenca + Harpun + Tonus	0,075%	28
				0,02%	28
		jabukin smotavac		0,1%	28
		biljne vaši		0,025%	28

	Drugo posle precvetavanja	čađava pegavost lista i krastavost plodova i pepelnica	Galileo + Insajder + Laguna	0,075%	35
		jabukin smotavac		0,04-0,05%	28
				0,02%	14
	Treće posle precvetavanja	čađava pegavost lista i krastavost plodova, pepelnica	Kardinal + Sekvenca + Triton	0,075%	28
		jabukin smotavac		0,02%	28
				0,25 - 0,3%	7
	Četvrto posle precvetavanja	čađava pegavost lista i krastavost plodova pepelnica, prouzrokovajući skladišnih bolesti	Metod 480 SC + Belatrix + Polux	0,3%	21
		štetni insekti		0,015%	14
				0,03-0,05%	7
	Prema potrebi	fitofagne grinje	Kentaur ili Adut (NOVO) + Nu Film 17	0,05%	14
				1,2-1,8 l/ha	30
				0,1%	
	Peto posle precvetavanja	čađava pegavost lista i krastavost plodova, pepelnica	Metod 480 SC + Sekvenca + Laguna + Tonus	0,3%	21
		jabukin smotavac		0,02%	28
		biljne vaši		0,02%	14
				0,025%	28
	Šesto posle precvetavanja	čađava pegavost lista i krastavost plodova pepelnica, prouzrokovajući skladišnih bolesti	Metod 480 SC + Belatrix + Kozak	0,3%	21
		štetni insekti		0,015%	14
				0,01-0,02%	14
	Sedmo posle precvetavanja	čađava pegavost lista i krastavost plodova	Metod 480 SC + Traper	0,3%	21
		jabukin smotavac		0,05%	7
	Osmo posle precvetavanja	prouzrokovajući skladišnih bolesti	Flux + Triton	0,1%	7
		jabukin smotavac		0,25 - 0,3%	7
	Deveto posle precvetavanja	prouzrokovajući skladišnih bolesti	Flux + Traper	0,1%	7
		jabukin smotavac		0,05%	7
	Jesenji tretman	prezimjavajuće forme prouzrokovaca bolesti	Cuprozin 35 WP	0,35%	OVP

Napomena: preporučena količina vode za navedene koncentracije primene je 1000 l/ha

Suzbijanje korova: Glifol -	kada su korovi visine 10-40 cm (za zasade starije od 4 godine)	35
	2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova	
	4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova	
Kabuki 2,5 EC -	0,8 l/ha za suzbijanje širokolisnih korova kada su u fazi 2-6 listova	OVP
	0,8 l/ha za suzbijanje izbojaka korena i stabla:	
	prvo tretiranje - u proleće kada su izbojci 10-15 cm dužine	
	drugo tretiranje - kada izrastu novi izbojci i dostignu 10-15 cm dužine	
Spektrum -	0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova	28
	1,3 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova	

Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke

 Program ishrane jabuke

Vreme primene	Folijarno (preko lista)	
	Preparat	Količina primene
Mišije uši	Foligal Feed Bor 150	1l/ha
	+ Foligal Feed Cink 700	1l/ha
Zeleni buketići	Foligal Feed Bor 150	1l/ha
	+ Foligal Feed Cink 700	1l/ha
	+ Foligal Feed Man 500	1l/ha
Roze pupoljak	Activeg Vegetative	3l/ha
	+ Fitopin	100ml/ha
Beli baloni	Activeg Vegetative	3l/ha
	+ Fitopin	100ml/ha
Precvetavanje	Foligal Feed CalMax	3l/ha
	Foligal Feed Mag 500	1l/ha
Prvo posle precvetavanja	Foligal Feed CalMax	3l/ha
	Foligal Feed Mag 500	1l/ha
Drugo posle precvetavanja	Fertigal CaB Organo	3l/ha
	+ Activeg Gold	3l/ha
Treće posle precvetavanja	Fertigal CaB Organo	3l/ha
	+ Activeg Gold	3l/ha
Četvrto posle precvetavanja	Foligal Feed CalMaX	3l/ha
Prema potrebi	Foligal Feed CalMaX	3l/ha
Peto posle precvetavanja	Foligal Feed CalMaX	3l/ha
Šesto posle precvetavanja	Foligal Feed CalMaX	3l/ha
Sedmo posle precvetavanja	Foligal Feed CalMaX	3l/ha
Osmo posle precvetavanja	Foligal Feed CalPit	3l/ha
Deveto posle precvetavanja	Foligal Feed CalPit	3l/ha
Jesenji tretman	Foligal Feed Bor 150	1l/ha
	+ Foligal Feed Cink 700	1l/ha
	+ Foligal Feed Man 500	1l/ha
		1l/ha

Napomena: preporučena količina vode za navedene koncentracije primene je 1000 l/ha



Efikasna zaštita od jabukinog smotavca

NOVO

LAGUNA[®]



TRITON

Traper



► Zaštita kruške



Faza razvoja/Vreme primene	Namena	Preparat	Koncentracija/ količina primene	Karenca (dani)
	Mirovanje vegetacije	kruškina buva	Galmin + Cipkord 20 EC	3 - 4% 0,03% OVP 28
	Bubrenje pupoljaka	prezimljavajuće forme prouzrokovaca bolesti	Bakarni oksihlorid 50	0,5% OVP
	Mišije uši	čađava pegavost lista kruškina buva	preparat na bazi a.s. folpet + Polux	0,2 % 0,05% 7
	Beli baloni	čađava pegavost lista kruškina buva	Metod 480 SC + Pehar + Harpun	0,3% 0,1% 0,15% 21 28 28
	Cvetanje	čađava pegavost lista	Galileo + Pehar	0,05 - 0,075% 0,1% 42 28
	Precvetavanje	čađava pegavost lišća i krastavost plodova kruškina buva	Galileo + Sekvenca + Galmin + preparat na bazi a.s. acetamiprid	0,05 - 0,075% 0,02% 0,3% 0,025% 42 28 21
	Prvo posle precvetavanja	čađava pegavost lista i krastavost plodova štetni insekti	Galileo + Sekvenca Limocide + preparat na bazi a.s. flonikamid	0,05 - 0,075% 0,02% 2,8 l/ha 0,014% 42 28 1
	Drugo posle precvetavanja	čađava pegavost lista i krastavost plodova kruškina buva	Metod 480 SC + Sekvenca Limocide	0,3% 0,02% 2,8 l/ha 21 28 1
	Treće posle precvetavanja	čađava pegavost lišća i krastavost plodova	Metod 480 SC	0,3% 21
	Četvrto posle precvetavanja	čađava pegavost lista i krastavost plodova kruškina buva	Metod 480 SC Limocide	0,3% 2,8 l/ha 21 1
	Peto posle precvetavanja	prouzrokovaci skladišnih bolesti štetni insekti, kruškina buva	Flux Polux + Limocide	0,1% 0,05% 2,8 l/ha 3 7 1

	15 dana pred berbu	prouzrokovajući skladišnih bolesti	Flux	0,1%	3
		kruškina buva	Limocide	2,8 l/ha	1
	Pred berbu (po potrebi)	kruškina buva	Limocide	2,8 l/ha	1
	Jesenji tretman	prezimljavajuće forme prouzrokovaca bolesti	Bakarni oksihlorid 50	0,5%	/

Napomena: preporučena količina vode za navedene koncentracije primene je 1000 l/ha

Suzbijanje korova: **Glifol** - Kada su korovi visine 10-40 cm (za zasade starije od 4 godine) 35
 2 - 4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova
 4 - 8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova
Spektrum - 0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova 28
 1,3 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova

Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke

► Program ishrane kruške

Vreme primene	Folijarno (preko lista)	
	Preparat	Količina primene
Mišije uši	Foligal Feed Cink 700	1 l/ha
Beli baloni	Foligal Feed Bor 150 + Foligal Feed Cink 700	1,5 l/ha 2 l/ha
Cvetanje	Foligal Feed Bor 150 + Fitopin	1,5 l/ha 100 ml/ha
Precvetavanje	Activeg Vegetative + Fertigal CaB Organo	3 l/ha 3 l/ha
Prvo posle precvetavanja	Fertigal CaB Organo	3 l/ha
Drugo posle precvetavanja	Foligal Feed CalMax + Activeg Vegetative	3 l/ha 3 l/ha
Treće posle precvetavanja	Foligal Feed CalMax	3 l/ha
Četvrto posle precvetavanja	Activeg Gold + Foligal Feed CalMax	1 - 3 l/ha 3 l/ha
Peto posle precvetavanja	Foligal Feed CalMax + Activeg Gold	3 l/ha 1 - 3 l/ha
Pred berbu	Foligal Feed CalMax	3 l/ha
Posle berbe, a pre opadanja lišća	Foligal Feed Bor 150 + Foligal Feed Cink 700 + Foligal Feed Mag 500 + Foligal Feed Man 500	2 l/ha 1 l/ha 2 - 4 l/ha 1 l/ha

► Zaštita višnje



Faza razvoja/Vreme primene	Namena	Preparat	Koncentracija/ količina primene	Karenca (dani)
	Kretanje vegetacije	prezimljavajuće forme prouzrokovaca bolesti i štetnih insekata	Bakarni oksihlorid 50 + preparat na bazi a.s. mineralno ulje	0,5% 2-3% OVP
	Beli baloni (otvoreno do 25% cvetova)	monilioza	Neon	0,05% 14
	Cvetanje (otvoreno 100% cvetova)	monilioza	Neon ili Akord	0,05% 0,075% 14 21
	Produženo cvetanje	monilioza	Sekvenca	0,02% OVP
	Precvetavanje	pegavost lista, šupljikavost	Galileo	0,075% 35
		monilioza	+ Akord	0,075% 21
		biljne vaši	+ Talent	0,012-0,014% 14
	Plodovi u porastu	pegavost lišća	Acustic	0,15% 14
		monilioza	+ Sekvenca	0,02% OVP
		biljne vaši	+ Polux	0,05% 14
	Promena boje ploda	šupljikavost lišća	Metod 480 SC	0,3% 21
		mrka trulež plodova	+ Flux	0,1% 3
		trešnjina muva	+ Tonus	0,025% 14
		fitofagne grinje	*Adut (NOVO)	1,5-1,8 l/ha 21
	14 dana pred berbu	pegavost lišća	Acustic	0,15% 14
		trešnjina muva	+ Polux	0,07% 14
	7 dana pred berbu	mrka trulež plodova	Flux	0,1% 3
		ubrzavanje i ujednačavanje sazrevanja plodova	**Adversis	0,05-0,07% 7
	Posle berbe	pegavost lišća	Galileo	0,075% 35
	Jesenji tretman	prezimljavajuće forme prouzrokovaca bolesti	Bakarni oksihlorid 50	0,5% /

Napomena: Preporučena količina vode za navedene koncentracije je 1000 l/ha

* U toku je proces registracije

****Adversis** se primenjuje u količini od 0,23 l/m visine krošnje/ha

Suzbijanje korova: **Glifol** - Kada su korovi visine 10-40 cm (za zasade starije od 4 godine) 35

2 - 4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova

4 - 8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova

Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke

► Zaštita breskve



Faza razvoja/Vreme primene	Namena	Preparat	Koncentracija/ količina primene	Karenca (dani)
	Mirovanje vegetacije	prezimljavajuće forme prouzrokovaca bolesti i štetnih insekata	Bakarni oksihlorid 50 + Galmin ili Plavo ulje	0,5% 3 - 4% OVP
				OVP
	Bubrenje pupoljaka	kovrdžavost lista breskve	Diziram 76 WG ili Acustic	0,3% 0,15 - 0,25% OVP
	Razmicanje pupoljaka (pred pojavu zelene tačke)	kovrdžavost lista breskve	Diziram 76 WG ili Galileo	0,3% 0,075% OVP
	Roze pupoljak	rđasta mrežavost plodova	preparat na bazi a.s. krezoksim metil + Talent	0,02% 0,14 kg/ha 21
	Cvetanje	monilioza	Neon ili Insajder	0,05% 0,02-0,03% 14 7
	Precvetavanje	šupljikavost lista	Metod 480 SC + Pehar	0,3% 0,2% 21 21
		monilioza	+ Belatrix	0,1 - 0,15 l/ha 7
		pepelnica	+ Tonus	0,025% 14
		biljne vaši		
	Plod veličine oraha	šupljikavost lista	Metod 480 SC + Akord	0,3% 0,075% 21 7
		pepelnica	+ Harpun	0,1% 28
		breskvin smotavac	+ Talent	0,14kg/ha 21
		biljne vaši		
	Nakon proređivanja	bolesti lista	Diziram 76 WG + Belatrix	0,3% 0,1 - 0,15 l/ha 21 7
		pepelnica	+ Triton	0,25 - 0,3% 7
		breskvin smotavac	+ Tonus	0,025% 14
		biljne vaši		
	15 -20 dana nakon proređivanja	šupljikavost lista	Metod 480 SC + Belatrix	0,3% 0,1 - 0,15 l/ha 21 7
		pepelnica	+ Insajder	0,02-0,03% 7
		mrka trulež plodova	+ *Traper	0,5-0,6 l/ha 7
		tripsi	+ Polux	0,05% 14
		breskvin smotavac	+ Flux	0,1% 7
	14 dana pred berbu	mrka trulež ploda	+ Triton	0,25 - 0,3% 7
		breskvin smotavac		
	7 dana pred berbu	mrka trulež plodova	Flux + *Traper	0,1% 0,5-0,6 l/ha 7
	Jesenji tretman	prezimljavajuće forme prouzrokovaca bolesti	Bakarni oksihlorid 50	0,5% /

* U toku je proces registracije

Napomena: preporučena količina vode za navedene koncentracije primene je 1000 l/ha



► Zaštita kajsije



Faza razvoja/Vreme primene	Namena	Preparat	Koncentracija primene	Karenca (dani)
	Mirovanje vegetacije	prezimljavajuće forme prouzrokovaca bolesti i štetnih insekata	Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin	0,4% 0,3% 2% OVP
	Početak cvetanja (otvoreno do 20% cvetova)	monilioza	Neon ili Pehar	0,05% 0,2% 14 21
	Cvetanje	monilioza	Neon	0,05% 14
	Produženo cvetanje	monilioza	Pehar	0,2% 21
	Precvetavanje	šupljikavost lišća monilioza biljne vaši	Galileo + Sekvenca + Tonus	0,075% 0,03% 0,025% 35 OVP 14
	Formiranje plodova	šupljikavost lišća jabukin smotavac, breskvin smotavac biljne vaši	Metod 480 SC + Harpun + Polux	0,3% 0,04-0,05% 0,03-0,05% 21 14 3
	Porast plodova	šupljikavost lišća mrka trulež plodova biljne vaši	Metod 480 SC + Akord + Tonus	0,3% 0,075% 0,025% 21 7 14
	14 dana pred berbu	mrka trulež plodova breskvin smotavac	Flux + Triton	0,1% 0,25-0,3% 7 7
	7 dana pred berbu	mrka trulež plodova jabukin smotavac	Flux + Polux	0,1% 0,03-0,05% 7 3
	Jesenji tretman	prezimljavajuće forme prouzrokovaca bolesti	Bakarni-oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP	0,4% 0,3% /

Napomena: Preporučena količina vode za navedene koncentracije je 1000 l/ha

Suzbijanje korova: **Glifol** - Kada su korovi visine 10-40 cm (za zasade starije od 4 godine) 35
2 - 4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova
4 - 8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova

Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke

► Zaštita šljive



Faza razvoja/Vreme primene	Namena	Preparat	Koncentracija primene	Karenca (dani)
	Pred kretanje vegetacije- bubrenje pupoljaka	prezimljavajuće forme prouzrokovala bolesti i štetnih insekata	Bakarni oksihlorid 50 + Galmin	0,5% OVP
			ili Plavo ulje	3-4% OVP
				3% OVP
	Početak cvetanja (otvoreno do 20% cvetova)	monilioza	Neon ili Akord	0,05% 14
				0,075% 21
	Puno cvetanje (otvoreno 100% cvetova)	monilioza	Sekvenca ili Neon	0,02% OVP
				0,05% 14
	Precvetavanje	bolesti lista	*Foltex +	0,1-0,125% 21
		monilioza	Akord +	0,075% 21
		šljivina osa	Karika	0,06 - 0,08% 28
	Formiran plod	bolesti lista	Metod 480 SC +	0,2-0,3% 21
		monilioza	Akord +	0,075% 21
		šljivin smotavac	preparat na bazi a.s hlorantranpiliprol +	0,02% 14
		štetni insekti	Polux	0,03-0,05% 14
	Promena boje ploda	bolesti lista	Metod 480 SC +	0,3% 21
		mrka trulež ploda	Flux +	0,1% 3
		štetni insekti	Karika	0,06 - 0,08% 28
	14 dana pred berbu	mrka trulež plodova	Flux +	0,1% 3
		šljivin smotavac	Triton	0,2-0,25% 7
	Jesenji tretman	prezimljavajuće forme prouzrokovala bolesti	Bakarni oksihlorid 50	0,5% OVP

*U toku je proces registracije

Napomena: preporučena količina vode za navedene koncentracije primene je 1000 l/ha

Suzbijanje korova: **Glifol** - kada su korovi visine 10-40 (za zasade starije od 4 godine) 35
 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova
 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova
Kabuki 2,5 EC - 0,8 l/ha za suzbijanje širokolisnih korova kada su u fazi 2-6 listova OVP
 0,8 l/ha za suzbijanje izbojaka korena i stabla:
 prvo tretiranje - u proleće kada su izbojci 10-15 cm dužine
 drugo tretiranje - kada izrastu novi izbojci i dostignu 10-15 cm dužine

Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke



Pravi put u zaštiti bilja



► Program ishrane koštičavih voćaka (višnja, breskva, kajsija, šljiva)

	Vreme primene	Folijarno (preko lista)	
		Preparat	Količina primene
	Pred cvetanje	Foligal Feed Bor 150 + Foligal Feed Cink 700 + Fitopin	1,5l/ha 1l/ha 100ml/ha
	Cvetanje	Foligal Feed Bor 150 + Fitopin	1,5l/ha 100ml/ha
	Precvetavanje	Activeg Vegetative + Fertigal Feed Cal Max	3-5l/ha 3l/ha
	Zametnut plod	Activeg Vegetative + Foligal Feed CalMax	3-5l/ha 3l/ha
		Foligal Feed Mag 500	2-4l/ha
	Intenzivan porast plodova	Activeg Gold + Fertigal Feed Cal Max	1-3l/ha 3l/ha
	Sazrevanje plodova	Foligal Feed CalMax ili Foligal Feed CalPit	3l/ha 3 l/ha
	Pred berbu	Activeg Gold	3l/ha
	Posle berbe, a pre opadanja lišća	Foligal Feed Bor 150 + Foligal Feed Cink 700 + Foligal Feed Man 500 + Foligal Feed Mag 500	1-2l/ha 1l/ha 1l/ha 2-4l/ha

Napomena: preporučena količina vode za navedene koncentracije primene je 1000 l/ha



▶ Zaštita borovnice



Faza razvoja/Vreme primene	Namena	Preparat	Koncentracija primene	Karenca (dani)
	Zimsko mirovanje	bakterioze, prezimljavajuće forme prouzrokovaca bolesti biljne vaši	0,35% 2%	OVP
	Otvaranje pupoljaka	sušenje izdanaka biljne vaši cvetojed	Promesa + preparat na bazi a.s. flonikamid + Kozak	0,075% 0,014% 0,02-0,03% 28
	Početak cvetanja	siva trulež ploda	Pehar ili Atlas ili Flux	0,2% 0,1% 0,15-0,2% 14 10 7
	Cvetanje	monilija	Sekvenca	0,04% OVP
	Precvetavanje	sušenje lastara biljne vaši	Promesa + preparat na bazi a.s. acetamiprid	0,075% 0,025%
	10 dana pred berbu	siva trulež	Flux ili Atlas	0,15-0,2% 0,1% 7 10
	Neposredno pred berbu	siva trulež	Libreto	0,1-0,15% 3
	Posle berbe	prezimljavajuće forme prouzrokovaca bolesti i štetočina	preparat na bazi a.s. kaptan + preparat na bazi a.s. deltametrin	0,3% 0,05%
	Jesenji tretman	prezimljavajuće forme prouzrokovaca bolesti i štetočina	preparat na bazi a.s. bakarni oksihlorid	0,35%

Napomena: preporučena količina vode za navedene koncentracije primene je 1000 l/ha

▶ Program ishrane borovnice


	Vreme primene	Folijarno (preko lista)	
		Preparat	Količina primene
	Otvaranje pupoljaka	Activeg Vegetative	3l/ha
	Neposredno pred cvetanje	Foligal Feed Bor 150 +	1l/ha
		Activeg Vegetative	3l/ha
	Precvetavanje	Foligal Feed CalMax +	3l/ha
		Foligal Feed Man 500 +	1l/ha
		Activeg Gold	3l/ha
	10 dana pred berbu	Foligal Feed CalMax	3l/ha
	Neposredno pred berbu	Foligal Feed CalMax	3l/ha
	Posle berbe	Foligal Feed Bor 150 +	1l/ha
		Foligal Feed Cink 700	1l/ha

Napomena: preporučena količina vode za navedene koncentracije primene je 1000 l/ha



► Zaštita maline



Faza razvoja/Vreme primene	Namena	Preparat	Količina/ koncentracija primene	Karenca (dani)	
	Mirovanje	prezimljavajuće forme prouzrokovaca bolesti i štetnih insekata- sušenje lastara maline	Plavo ulje	2%	OVP
	Početak listanja	sušenje izdanaka	Cuprozin 35 WP ili *Galoksid + Tonus	0,35% 0,3 - 0,35% 0,3 kg/ha	OVP OVP 14
		štetni insekti			
	Pred jasno izdvajanje zatvorenih pupoljaka (bočni izdanci dužine 10-15cm)	rđa maline	Akord + Kozak	0,8 l/ha 0,03%	14 28
		cvetojed			
		fitofagne grinje	preparat na bazi a.s. ulje pomorandže	2l/ha	
	Neposredno pred cvetanje	sušenje izdanaka, siva trulež	Insajder + Pehar + Kozak	0,3-0,4 l/ha 0,2% 0,03%	7 14 28
		siva trulež			
		štetni insekti			
		fitofagne grinje	preparat na bazi a.s. ulje pomorandže	2l/ha	
	Precvetavanje i početak formiranja plodova	sušenje izdanaka	Metod 480 SC + Atlas flow + Tonus	2 - 3 l/ha 1 l/ha 0,3 kg/ha	7 7 14
		siva trulež			
		štetni insekti			
	14 dana pred berbu	sušenje izdanaka	Promesa + Sekvenca + Libreto + Traper	0,075% 0,5 l/ha 1 - 1,5 l/ha 0,2-0,4 l/ha	10 14 3 3
		siva trulež			
		štetni insekti			
	7 dana pred berbu	siva trulež	Atlas flow ili Flux + Traper	1 l/ha 1,5 - 2 l/ha 0,2-0,4 l/ha	7 7 3
		štetni insekti			
	Između berbi	siva trulež	Libreto	1 - 1,5 l/ha	3
	Nakon berbe i uklanjanja izdanaka	rđa maline	Akord ili Insajder	0,8 l/ha 0,3-0,4 l/ha	14 7
		bolesti sušenja izdanaka			
		fitofagne grinje	preparat na bazi a.s. ulje pomorandže	2l/ha	
	Jesenje tretiranje pre opadanja lišća	bolesti sušenja izdanaka	Cuprozin 35 WP ili *Galoksid	0,35% 0,3 - 0,35%	OVP OVP

*U toku je proces registracije

Suzbijanje korova: **Kabuki 2,5 EC** - 0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih izdanaka maline i korova u porastu 15-20 cm OVP
Spektrum - 0,8-1,3 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova 45

Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke

▶ Zaštita kupine



Faza razvoja/Vreme primene		Namena	Preparat	Količina/ koncentracija primene	Karenca (dani)
	Mirovanje	prezimljavajuće forme prouzrokovaca bolesti i štetnih insekata	Plavo ulje	2%	OVP
	Početak listanja	rđa štetni insekti	Akord + preparat na bazi a.s. deltametrin	0,8 l/ha 0,03%	14
	Vidljivi cvetni pupoljci	bolesti stabla	Sekvenca + Promesa + Pehar + Kozak	0,5 l/ha 0,075% 0,2% 0,02% - 0,03%	14 10 14 28
		siva trulež			
		štetni insekti			
	Cvetanje	bolesti stabla siva trulež	Metod 480 SC + Pehar	2 - 3 l/ha 0,2%	7 14
	14 dana pred berbu	rđa	Akord + Flux + preparat na bazi a.s. deltametrin	0,8 l/ha 1,5 - 2 l/ha 0,03%	14 7
		siva trulež			
		štetni insekti			
	3 dana pred berbu	siva trulež štetni insekti	Libreto + preparat na bazi a.s. spinosad	1 - 1,5 l/ha 0,4 l/ha	3
	Između berbi	siva trulež	Libreto	1 - 1,5 l/ha	3
	Posle berbe	bolesti stabla	Metod 480 SC + Sekvenca	2 - 3 l/ha 0,5 l/ha	7 14
	Jesenji tretman	bolesti stabla	preparat na bazi a.m. bakar oksihlorid	0,25%	

* U toku je proces registracije

Suzbijanje korova: **Spektrum** - 1,5 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova

45

Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke



▶ Program ishrane maline i kupine

Vreme primene	Fertirigacija (preko sistema kap po kap)		Folijarno (preko lista)	
	Proizvod	Količina primene	Proizvod	Količina primene
Pred početak vegetacije	Solugal Start NPK 11-40-11+ME	30 kg/ha		
Početak listanja	Solugal Vegetative NPK 24-10-10+2MgO+ME	30 kg/ha	Foligal Feed Cink 700 + Activeg Vegetative	0,5 l/ha 2 l/ha
Pred jasno izdvajanje zatvorenih cvetova	Nutrivit Calcium Nitrate HG	30 kg/ha	Foligal Feed Bor 150	2 l/ha
Porast bočnih lastara	Solugal Universal NPK 20-20-20+ME	30 kg/ha	Activeg Vegetative	3 l/ha
Tokom cvetanja	Nutrivit Magnesium Sulphate HG	10 kg/ha	Foligal Feed Bor 150 + Fitopin	2 l/ha
	Nutrivit Calcium Nitrate HG	30 kg/ha		100 ml/ha
Tokom formiranja plodova	Solugal Vegetative NPK 24-10-10+2MgO+ME	25-30 kg/ha	Activeg Vegetative	3 l/ha
			Foligal Feed Mag 500	2 l/ha
Intenzivan rast plodova	Solugal Universal NPK 20-20-20+ME	25-35 kg/ha	Activeg Gold	2 l/ha
Tokom sazrevanja plodova	Solugal Ripe NPK 13-5-30+2MgO+3CaO+ME	25-30 kg/ha	Activeg Gold	2 l/ha
Posle berbe	Solugal Universal NPK 20-20-20+ME	20 kg/ha	Foligal Feed Bor 150 +	2 l/ha
			Foligal Feed Cink 700 +	1 l/ha
			Foligal Feed Mag 500	2 l/ha

Za zdrave plodove bez truleži!

Libreto®

Atlas flow





► Zaštita jagode



Faza razvoja/Vreme primene		Namena	Preparat	Količina/ koncentracija primene	Karenca (dani)
	Početak vegetacije	plamenjača (trulež) korena	**Legat SP	0,25%	14
		siva pegavost lista	Metod 480 SC	2-3 l/ha	21
		štetni insekti	Kozak	0,02-0,03%	28
			Polux	0,03-0,05%	3
	Intenzivni porast	siva pegavost lista	Metod 480 SC	2-3 l/ha	21
		cvetojed	Akord	0,75 l/ha	21
			Tonus	0,3 kg/ha	14
	Vidljivi zatvoreni cvetni pupoljci	siva pegavost lista	Akord	0,75 l/ha	21
		siva trulež	Pehar	0,2%	14
		pepelnica, štetni insekti	Limocide	3 - 4 l/ha	1
	Puno cvetanje	siva pegavost lista	Promesa	0,75 l/ha	10
		siva trulež	Pehar	0,2%	14
	Precvetavanje	siva pegavost lista	Promesa	0,75 l/ha	10
		siva trulež	*Atlas Flow	1-1,2 l/ha	7
		cvetojed	Tonus	0,3 kg/ha	14
	Rast plodova	siva trulež	Libreto	1 - 1,5 l/ha	3
		štetni insekti	*Atlas Flow	1-1,2 l/ha	7
			preparat na bazi a.s. spinosad	0,2 -0,4 l/ha	
			Limocide	3 - 4 l/ha	1
	7 dana pred berbu	siva trulež	Flux	1,5 - 2 l/ha	7
		štetni insekti	Polux	0,03 - 0,05%	3
	3 dana pred berbu	siva trulež	Libreto	1 - 1,5 l/ha	3
	Između berbi	pepelnica, štetni insekti	Limocide	3 - 4 l/ha	1
	Posle berbe	siva pegavost lista	Metod 480 SC	2 - 3 l/ha	21
	Nakon sadnje	plamenjača (trulež) korena	**Legat SP	0,25%	14

*U toku je proces registracije

****Legat SP** primeniti sistemom za zalivanje u konc. 0,25% uz utrošak vode od 1000 litara (2,5 kg u 1000 litara vode koristiti na 1 ha zasada)



▶ Program ishrane jagode

Vreme primene	Fertirigacija (preko sistema kap po kap)		Folijarno (preko lista)	
	Proizvod	Količina primene	Proizvod	Količina primene
Početak vegetacije (posle sadnje)	Solugal Start NPK 11-40-11+ME	20-30 kg/ha	Activeg Vegetative	3 l/ha
Početak listanja	Solugal Vegetative NPK 24-10-10+2MgO+ME	30 kg/ha	Activeg Vegetative	3 l/ha
Do početka cvetanja	Solugal Vegetative NPK 24-10-10+2MgO+ME	30 kg/ha	Foligal Feed Bor 150 + Foligal Feed Cink 700	1 l/ha
	+ Nutrivit Magnesium Sulphate HG	15 kg/ha		1 l/ha
Tokom cvetanja i formiranja plodova	Solugal Universal NPK 20-20-20+ME	20 kg/ha	Activeg Gold + Fitopin	2 l/ha
	+ Nutrivit Magnesium Sulphate HG	15 kg/ha		100 ml/ha
	Nutrivit Calcium Nitrate HG	15 kg/ha		
Zametanje plodova	Solugal Universal NPK 20-20-20+ME	30 kg/ha	Activeg Gold	1 l/ha
	Nutrivit Calcium Nitrate HG	15 kg/ha		
Intenzivan rast plodova	Solugal Ripe NPK 13-5-30+2MgO+3CaO+ME	30 kg/ha	Foligal Feed Man 500	1 l/ha
	+ Nutrivit Magnesium Sulphate HG	10 kg/ha		
Sazrevanje plodova i tokom berbe	Solugal Ripe NPK 13-5-30+2MgO+3CaO+ME	30 kg/ha	Activeg Gold	1 l/ha



Limocide 

Legat® SP



► Zaštita vinove loze



Faza razvoja/Vreme primene	Namena	Preparat	Količina/ koncentracija primene	Karenca (dani)
	Mirovanje vegetacije	prezimljavajuće forme prouzrokovaca bolesti, štetnih insekata i grinja	Bakarni oksihlorid 50 + Galmin	0,5% 3 - 4% 28 OVP
	Bubrenje pupoljaka	pepelnica	Cosavet 80 DF	0,5 - 0,7% 28
	Lastari dužine 5-10 cm	plamenjača	Foltex + Lunar	0,15-0,2% 56*** i 28**
		pepelnica – primarni izvor zaraze	+ Cipkord 20 EC	0,2 l/ha 35
		štetni insekti		0,03% 56
	Lastari dužine 20-30 cm	plamenjača	Alijansa plus + Sekvenca	2,5 kg/ha 0,012% 21
		pepelnica		21
		eriofidne grinje	Limocide	2 l/ha 1
	Pred cvetanje	plamenjača	Metod 480 SC + Legat SP	0,3% 35
			ili	0,2% 21*** i 42**
			Foltex + Legat SP	0,15-0,2% 56*** i 28**
			ili	0,2% 21*** i 42**
			Evolvente (NOVO)	3-4 kg/ha 42
		pepelnica	+ Insajder + Cipkord 20 EC	0,03-0,05% 0,03% 3*** i 21**
		štetni insekti		56
	Precvetavanje	plamenjača	Metod 480 SC + Legat SP	0,3% 35
			ili	0,2% 21*** i 42**
			Foltex + Legat SP	0,15-0,2% 56*** i 28**
			ili	0,2% 21*** i 42**
			Evolvente (NOVO)	3-4 kg/ha 42
		pepelnica	+ Insajder + Pehar	0,03-0,05% 2 l/ha 3*** i 21**
		siva trulež		35
	Drugo tretiranje posle cvetanja, 10-14 dana nakon prethodnog, kraj juna	eriofidne grinje	Limocide	2 l/ha 1
		plamenjača	Alijansa plus	2,5 kg/ha 21
		pepelnica	Akord ili Sekvenca + Pehar	0,4 l/ha 0,012% 21
		siva trulež		2 l/ha 35
		grozdov smotavac	*Laguna	0,015-0,018% 3*** i 30**



	Treće tretiranje posle cvetanja, polovinom jula	plamenjača	Crux + Vokal C + Sekvenca + Cosavet 80 DF + Flux + Polux	0,6 - 0,7 l/ha	21
		pepelnica		1-1,2 l/ha	21
		siva trulež		0,012%	21
		grozdiv smotavac		0,3% - 0,5%	28
				1 l/ha	21
	Početak šarka	grozdiv smotavac		0,03-0,05%	21
		plamenjača	Borvo(NOVO)	1,5%	21*** i 28**
			Cuprozin 35 WP ili Crux + Vokal C + Cosavet 80 DF + Libreto + Polux	0,35%	28
		plamenjača		0,6-0,7 l/ha	21
		pepelnica		1-1,2 l/ha	21
		siva trulež		0,3% - 0,5%	28
		grozdiv smotavac		1 l/ha	7*** i 21**
				0,03-0,05%	21

*U toku je proces registracije

** Za vinske sorte *** Za stone sorte

Suzbijanje korova: **Kabuki 2,5 EC** - 0,4- 0,8 l/ha, za suzbijanje izbojaka iz glave čokota, kada su izbojci dužine 10-14 cm. Po potrebi se mogu izvesti dva tretiranja, na 15 dana.

OVP

Glifol - 4 - 5 l/ha, korovi porasta 10 - 20 cm (uskolisni i širokolisni)

35

Obavezno je sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke.

► Program ishrane vinove loze

	Vreme primene	Folijarno (preko lista)	
		Preparat	Koncentracija/količina primene
	Lastari dužine 5-10 cm	Activeg Vegetative	0,2%
	Lastari dužine 20-30 cm	Foligal Feed Bor 150	0,2%
	Pred cvetanje	Foligal Feed Bor 150 + Fitopin	0,2% 50 ml/ha
	Precvetavanje	Solugal Ripe NPK 13-5-30+2MgO+3CaO+TE	0,25%
	Drugo tretiranje posle cvetanja, 10-14 dana nakon prethodnog, kraj juna	Solugal Universal NPK 20-20-20+ME + Activeg Gold	0,25% 0,2%
	Treće tretiranje posle cvetanja, polovinom jula	Solugal Ripe NPK 13-5-30+2MgO+3CaO+TE + Fitopin	0,25% 50ml/ha
	Početak šarka	Solugal Ripe NPK 13-5-30+2MgO+3CaO+TE + Activeg Gold	0,25% 0,2%

Evolvente



KATALOG PROIZVODA

2026



**GALENIKA
FITOFARMACIJA**


Astrid

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Izoksafutol (225 g/l preparata) + tienkarbazon-metil (90 g/l preparata) + protektant cipro-sulfamid (150 g/l preparata)
 Selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u usevu kukuruza.

PAKOVANJE: 200 ml, 1 l, 5 l **KOLIČINA PRIMENE:** 0,4 l/ha **KARENCA:** OVP


Basar

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: S-metolahlor (960 g/l preparata)

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevima kukuruza, soje, šećerne repe i suncokreta. Primenuje se tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja useva.

PAKOVANJE: 200 ml, 1 l, 5 l **KOLIČINA PRIMENE:** 1-1,5 l/ha **KARENCA:** OVP


Bonaca EC

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila (359 g/l preparata)

Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruza, luku, zasadima voća i vinove loze i na pašnjacima.

PAKOVANJE: 200 ml, 1 l, 5 l **KOLIČINA PRIMENE:** 0,4-2 l/ha **KARENCA:** OVP

NOVO

Ceres

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Jodosulfuron-metil-natrijum (25 g/l preparata) + amidosulfuron (100 g/l preparata) + protektant mefenpir-dietil (250 g/l preparata)
 Selektivni, translokacioni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevima pšenice i ječma.

PAKOVANJE: 1 l **KOLIČINA PRIMENE:** 0,15 l/ha **KARENCA:** OVP


Detektor

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Tribenuron-metil (750 g/kg preparata)

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice.

PAKOVANJE: 10 g, 20 g, 100 g, 250 g **KOLIČINA PRIMENE:** 15-25 g/ha **KARENCA:** OVP


Factor

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Flumioksazin (500 g/l preparata)

Selektivni, kontaktni herbicid, namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u usevu soje.

PAKOVANJE: 100 ml, 500 ml, 1 l **KOLIČINA PRIMENE:** 0,12 l/ha **KARENCA:** OVP


Galbenon

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Bentazon u obliku Na-soli (480 g/l preparata)

Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruza, soji, krompiru, grašku, pasulju, boraniji, stočnom grašku, lucerki i lanu.

PAKOVANJE: 1 l, 10 l **KOLIČINA PRIMENE:** 1,5-4 l/ha

KARENCA: grašak pasulj, krompir – 42 dana; strna žita, soja, kukuruz, lucerka, lan – 63 dana; boranija, stočni grašak (kada se primenjuje 13-15 BBCH) – 30 dana; stočni grašak (kada se primenjuje 15-39 BBCH) – 21 dan

**Galop**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.
AKTIVNA SUPSTANCA: Trikopir 480 g/l (trikopir botoksietil ester 667,9 g/l preparata)

Selektivni, translokacioni herbicid-arboricid namenjen za suzbijanje zeljastih i drvenastih širokolisnih korova na nepoljoprivrednim površinama.

PAKOVANJE: 100 ml, 1 l**KOLIČINA PRIMENE:** 1 l/ha**KARENCA:** OVP**Glifol**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.
AKTIVNA SUPSTANCA: Glifosat (480 g/l preparata)

Neselektivni herbicid vrlo širokog područja primene, za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama, zasadima voća i vinove loze.

PAKOVANJE: 100 ml, 300 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 200 l**KOLIČINA PRIMENE:** 2-10 l/ha**KARENCA:** zasadi voća, vinova loza - 35 dana**Globus EC**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.
AKTIVNA SUPSTANCA: Kvizalofop-p-etil (50 g/l preparata)

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, uljanjoj repici, krompiru.

PAKOVANJE: 1 l, 5 l**KOLIČINA PRIMENE:** 0,5-4 l/ha**KARENCA:** Soja, šećerna repa – 77 dana; suncokret, krompir, uljana repica - OVP**Kabuki 2,5 EC**

NICHINO EUROPE
AKTIVNA SUPSTANCA: Piraflufen-etil (26,5 g/l preparata)

Selektivni, kontakti herbicid namenjen za sušenje nadzemne mase (cime) u usevu krompira i za sušenje izbojaka korena i stabla u zasadima vinove loze, maline, jabuke, šljive i leske, kao i za suzbijanje širokolisnih korova u zasadima vinove loze, jabuke i šljive.

PAKOVANJE: 100 ml, 1 l**KOLIČINA PRIMENE:** 0,4-0,8 l/ha**KARENCA:** OVP**Kvazar**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.
AKTIVNA SUPSTANCA: Imazamoks (40 g/l preparata)

Selektivni, translokacioni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u usevima soje, suncokreta (otpornih na imidazolinone), lucerke u zasnivanju, graška, pasulja.

PAKOVANJE: 1 l, 5 l**KOLIČINA PRIMENE:** 1-1,2 l/ha**KARENCA:** Soja, grašak, pasulj i lucerka (u zasnivanju) - 35 dana; suncokret - OVP**Logan**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.
AKTIVNA SUPSTANCA: Izoksafutol (240 g/l preparata) + protektant ciprosulfamid (240 g/l preparata)

Sistemični herbicid širokog spektra delovanja namenjen za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.

PAKOVANJE: 500 ml, 1 l, 5 l**KOLIČINA PRIMENE:** 0,4 l/ha**KARENCA:** OVP



Lontrel 100



AKTIVNA SUPSTANCA: Klopirid (100 g/l preparata)

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruзу, pšenici, ječmu, šećernoj repi, uljanoj repici, crnom luku i praziluku.

PAKOVANJE: 1 l **KOLIČINA PRIMENE:** 0,6-1,5 l/ha

KARENCA: crni luk i praziluk - 42 dana; ostali usevi - OVP



Metak 700 SC



AKTIVNA SUPSTANCA: Metamitron (700 g/l preparata)

Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima šećerne repe.

PAKOVANJE: 1 l, 5 l

KOLIČINA PRIMENE: 3-4 l/ha

KARENCA: OVP



Monosan herbi 500



AKTIVNA SUPSTANCA: 2,4-D u obliku DMA soli (602,5 g/l preparata) ili 2,4-D (500 g/l preparata)

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice i kukuruза.

PAKOVANJE: 1 l

KOLIČINA PRIMENE: 1,5-2,5 l/ha

KARENCA: OVP



Octanus



AKTIVNA SUPSTANCA: Tribenuron-metil (600 g/kg preparata) + florasulam (200 g/kg preparata)

Selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu ozime pšenice.

PAKOVANJE: 25 g, 250 g

KOLIČINA PRIMENE: 25 g/ha

KARENCA: OVP



Okvir



AKTIVNA SUPSTANCA: Tifensulfuron-metil (750 g/kg preparata)

Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruзу, soji i lucerki. Primenjuje se kada su korovi u fazi od kotiledona do 6 listova, a u lucerki rano u proleće, pre kretanja vegetacije.

PAKOVANJE: 8 g

KOLIČINA PRIMENE: 8-20 g/ha

KARENCA: OVP



Pampas



AKTIVNA SUPSTANCA: Pinoksaden (50 g/l preparata)+ protektant klovintocet-meksil (12,5 g/l preparata)

Selektivni, translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje uskolisnih korova u usevu pšenice.

PAKOVANJE: 1 l

KOLIČINA PRIMENE: 0,6-1,2 l/ha

KARENCA: pšenica - OVP



Persej



AKTIVNA SUPSTANCA: Rimsulfuron (250 g/kg preparata)

Selektivni, translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruза.

PAKOVANJE: 30 g

KOLIČINA PRIMENE: 40-60 g/ha

KARENCA: Kukuruz merkantilni - OVP; kukuruz silažni - 63 dana


Pikogal plus

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Klopirid (300 g/l preparata)

Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi, cvekli, uljanoj repici, crnom luku (iz arpadžika), belom luku, praziluku i vlašcu (osim mladog vlašca).

PAKOVANJE: 100 ml, 300 ml, 1 l **KOLIČINA PRIMENE:** 0,2-0,5 l/ha

KARENCA: Crni luk, beli luk, praziluk, vlašac, mlada cvekla – 42 dana; šećerna repa, cvekla, uljana repica – OVP

Plamen

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Dikamba – DMA (577,9 g/l preparata)

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruзу i na nepoljoprivrednim površinama. Primenjuje se folijarno kada je kukuruz u fazi 2-5 listova, a korovi 2-6 listova.

PAKOVANJE: 100 ml, 200 ml, 1 l, 10 l **KOLIČINA PRIMENE:** 0,5-0,7 l/ha, 1,5 l/ha **KARENCA:** OVP

Rafal 120

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Kletodim (120 g/l preparata)

Selektivni herbicid za suzbijanje uskolisnih korova u suncokretu, soji, šećernoj repi, lucerki, krompiru, mrkvi, crnom i belom luku, grašku, pasulju, paprici, paradajzu, dinji, lubenici, krastavcu i kupusu.

PAKOVANJE: 100 ml, 1 l, 5 l **KOLIČINA PRIMENE:** 0,8-2 l/ha

KARENCA: Soja, suncokret, lucerka, krompir, šećerna repa – OVP; ostali usevi – 30 dana.

Rampa EC

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Klorazon (360 g/l preparata)

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u soji i uljanoj repici. Primenjuje se tretiranjem zemljišta, uz obaveznu inkorporaciju, neposredno pre setve/ sadnje. U soji se može primeniti i folijarno.

PAKOVANJE: 200 ml, 1 l **KOLIČINA PRIMENE:** 0,2-0,75 l/ha **KARENCA:** OVP

Rezon

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Terbutilazin (500 g/l preparata)

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruзу i suncokretu. Primenjuje se tretiranjem zemljišta, posle setve, a pre nicanja useva ili u kukuruзу najkasnije do pojave trećeg lista.

PAKOVANJE: 1 l, 10 l **KOLIČINA PRIMENE:** 1,5 l/ha **KARENCA:** OVP

Ritmix plus

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Bentazon (480 g/l preparata) + imazamoks (22,4 g/l preparata)

Selektivni herbicid, namenjen za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu soje.

PAKOVANJE: 1 l, 10 l **KOLIČINA PRIMENE:** 1,8 l/ha **KARENCA:** OVP

Skaut

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Mezontrion (480 g/l preparata)

Selektivni sistemski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruзу. Primenjuje se kada je usev kukuruзу u fazi razvoja od drugog do osmog lista, a kada su korovi u fazi od klijanja do razvijenih 6-8 listova.

PAKOVANJE: 250ml, 1 l

KOLIČINA PRIMENE: 0,15-0,25 l/ha Skaut + 0,5 % okvašivača **KARENCA:** OVP

**Spektrum**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Fluazifop-P-butil (150 g/l preparata)

Selektivni translokacioni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih, uskolisnih korova u usevima/ zasadima šećerne repe, suncokreta, soje, krompira, luka, jabuke, kruške, dunje, maline, kupine i borovnice.

PAKOVANJE: 1 l, 5 l **KOLIČINA PRIMENE:** 0,8-2,5 l/ha**KARENCA:** Jabuka, kruška, dunja- 28 dana; krompir – 42 dana; malina, kupina – 45 dana; luk – 49 dana; šećerna repa – 70 dana; borovnica – 90 dana; soja, suncokret – OVP**Talisman**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Nikosulfuron (40 g/l preparata)

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza.

PAKOVANJE: 300 ml, 1 l, 5 l, 10 l **KOLIČINA PRIMENE:** 1-1,5 l/ha **KARENCA:** OVP**Tezis**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Metsulfuron-metil (600 g/kg preparata)

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i ječmu. Primjenjuje se folijarno, kada je usev u fazi 3 lista, pa do pojave zastavičara, a korovi u fazi 2-4 lista

PAKOVANJE: 10 g **KOLIČINA PRIMENE:** 10 g/ha **KARENCA:** OVP**Zanat**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Pendimetalin (330 g/l preparata)

Selektivni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih korova u usevima kukuruza, krompira, soje, suncokreta, pšenice, graška, duvana, paradajza, paprike, kupusa iz rasada, luka iz semena i arpadžika, mrkve, peršuna, celera, pastrnka, praziluka, vlašca, pasulja, boranije, boba, sočiva, stočnog graška, kelja, karfiola, brokolija, kelerabe, prokelja.

PAKOVANJE: 200 ml, 1 l, 5 l **KOLIČINA PRIMENE:** 3-7 l/ha**KARENCA:** Paradajz – 42 dana; mrkva, celer, peršun, pastrnak – 60 dana; luk, praziluk, vlašac, krompir, kupus, paprika, grašak, pasulj, boranija, bob, sočivo, stočni grašak, kelj, karfiol, brokoli, keleraba, prokelj – 63 dana; kukuruz, pšenica, soja, suncokret, duvan, pasulj i bob – OVP**LOGAN®****Od setve pa sve
do 3. lista kukuruza!!!****Da od starta
dobro krene
u borbi protiv
korova!!!**



Acoustic


GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Dodin (400 g/l preparata)

Lokalsistemični fungicid sa protektivnim i izvesnim kurativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovala čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke u zasadu jabuke, prouzrokovala pegavosti lista u zasadu višnje i trešnje i prouzrokovala kovrdžavosti lista u zasadu breskve.

PAKOVANJE: 1 l **KONCENTRACIJA:** 0,15-0,25 %

KARENCA: 14 dana višnja i trešnja; 21 dan jabuka, OVP-breskva


Akord


GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Tebukonazol (250 g/l preparata)

Sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovala sušenja cvetova i grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća, sive pegavosti lista jagode, sive pegavosti oraha, rđe maline i kupine, pepelnice breskve, pepelnice vinove loze, pepelnice mrkve, peršuna, celera i pastrnaka, pepelnice tikve, bundeve, tikvice, dinje i lubenice, crne pegavosti paradajza, bolesti pšenice i bolesti uskladištenih proizvoda koštičavog voća

PAKOVANJE: 100 ml, 1 l **KOLIČINA/KONCENTRACIJA PRIMENE:** 0,3-1 l/ha; 0,05 %

KARENCA: 7 dana breskva, kajsija, tikva, bundeva, tikvica, dinja i lubenica, 14 dana malina, kupina i orah, 21 dan vinova loza, višnja, šljiva, jagoda, paradajz, mrkva, peršun, celer i pastrnak, OVP-pšenica


Akord WG


GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Tebukonazol (250 g/kg preparata)

Sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovala sušenja cvetova i rodni grančica i mrke truleži plodova u zasadu višnje i šljive, prouzrokovala pepelnice vinove loze, prouzrokovala crne pegavosti paradajza i sušenja lastara maline.

PAKOVANJE: 10 g **KOLIČINA PRIMENE:** 0,4-0,75 kg/ha

KARENCA: 21 dan


Alijansa plus


GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Bakar-oksihlorid (283,8 g/kg preparata) + metalaksil-M (38,8 g/kg preparata)

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovala plamenjače u zasadu vinove loze i usevu krompira.

PAKOVANJE: 1 kg **KOLIČINA PRIMENE:** 2,5 kg/ha

KARENCA: 21 dan vinova loza, 14 dana krompir


Atlas


GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Ciprodinil (375 g/kg preparata) + fludioksonil (250 g/kg preparata)

Sistemični i kontaktni folijarni fungicid za suzbijanje prouzrokovala sušenja cvetova i grančica i mrke truleži plodova kajsije, sive truleži maline, jagode, kupine, borovnice, vinove loze, paradajza, krastavca, tikvice i crnog luk, sive i bele truleži u usevima blitve, salate, rukole, radiča, endivije, matovilca, sive i bele truleži i crne pegavosti vlašca, sive i bele truleži, antraknoze i sive pegavosti u usevima pasulja i graška, pepelnice i rđe u usevu spanaća, bele truleži, krastavosti plodova, antraknoze i gumozne plamenjače u usevima dinje (u zatvorenom prostoru), tikve, bundeve i lubenice.

PAKOVANJE: 8g, 400 g **KOLIČINA PRIMENE:** 0,6-1 kg/ha

KARENCA: 3 dana paradajz, krastavac, dinja (u zatvorenom prostoru), tikva, tikvica, bundeva i lubenica; 7 dana malina, jagoda, kajsija, salata, rukola, endivija, radič, matovilac i spanać, 10 dana kupina i borovnica, 14 dana crni luk, vlašac i blitva; 28 dana pasulj, grašak i vinova loza.


Atlas flow


GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Ciprodinil (300 g/l preparata) + fludioksonil (200 g/l preparata)

Sistemični i kontaktni folijarni fungicid, namenjen za suzbijanje prouzrokovala sive truleži u zasadima maline, vinove loze, jagode i usevima paradajza, paprike i crnog luka.

PAKOVANJE: 1l **KOLIČINA PRIMENE:** 0,8-1,2 l/ha

KARENCA: 3 dana malina, jagoda, 7 dana paprika, 14 dana luk, 21 dan vinova loza.

NOVO



Avangard

 **GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.**

AKTIVNA SUPSTANCA: Sumpor (800g/kg)

Nesistemični preventivni fungicid namenjen za suzbijanje prouzrokovala pepelnice u zasadu jabuke

PAKOVANJE: 1 kg **KONCENTRACIJA:** 0,3 %

KARENCA: 14 dana



Balb

 **GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.**

AKTIVNA SUPSTANCA: Propamokarb-hidrohlid (722 g/l preparata)

Sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovala plamenjače u usevu paprike, krastavca, tikve, tikvice, bundeve, dinje i lubenice i poleganja rasada u zasadu lala.

PAKOVANJE: 100 ml, 300 ml **KONCENTRACIJA:** 0,15-0,3 %

KARENCA: 14 dana krastavac, tikva, tikvica, dinja, bundeva i lubenica; 35 dana paprika, OVP lala



Bakarni oksihlorid 50

 **GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.**

AKTIVNA SUPSTANCA: 50 % bakra iz bakar oksihlorida

Preventivni fungicid širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovala čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke i kruške, šupljikavosti lišća koštičavog voća, kovrdžavosti lišća breskve, plamenjače vinove loze, paradajza, krompira, hmelja

PAKOVANJE: 75 g, 1 kg **KOLIČINA/KONCENTRACIJA PRIMENE:** 1,5-2,4 kg/ha, 0,25-0,75 %

KARENCA: 14 dana hmelj, krompir, paradajz, 28 dana grožđe. OVP voće



Belatrix

 **GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.**

AKTIVNA SUPSTANCA: Trifloksistrobin (500 g/l preparata)

Lokalsistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem, namenjen za suzbijanje prouzrokovala pepelnice i skladišnih bolesti u zasadu jabuke, kao i prouzrokovala pepelnice u zasadu breskve.

PAKOVANJE: 1 l **KOLIČINA PRIMENE:** 0,1-0,15 l/ha

KARENCA: 7 dana breskva, 14 dana jabuka



Bordovska čorba 100 SC

 **GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.**

AKTIVNA SUPSTANCA: Bakar u obliku smeše bakar (II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida (100 g/l preparata)

Savremena formulacija jednog od najstarijih protektivnih fungicida namenjena za suzbijanje prouzrokovala plamenjače vinove loze.

PAKOVANJE: 300 ml, 1 l **KONCENTRACIJA PRIMENE:** 2,5 %

KARENCA: 21 dan stone sorte vinove loze, 28 dana vinske sorte vinove loze

NOVO



Borvo

 **GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.**

AKTIVNA SUPSTANCA: Bakar – iz Bordovske čorbe (200 g/kg preparata)

Folijarni fungicid, namenjen za suzbijanje prouzrokovala plamenjače u zasadu vinove loze.

PAKOVANJE: 1 kg **KONCENTRACIJA PRIMENE:** 1,5%

KARENCA: 21 dan za stone sorte, 28 dana za vinske sorte

**Cosavet 80 DF**

SML LIMITED

AKTIVNA SUPSTANCA: Sumpor (800 g/kg)

Nesistemični protektivni fungicid sa kontaktnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovala pepelnice jabuke i vinove loze, tretiranjem preventivno tokom vegetacije.

PAKOVANJE: 1 kg, 25 kg**KOLIČINA/KONCENTRACIJA PRIMENE:** 0,3 %, 5-7 kg/ha**KARENCA:** 14 dana za jabuku; 28 dana za vinovu lozu**Crux**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.
AKTIVNA SUPSTANCA: Cijazofamid (160 g/l preparata)

Nesistemični fungicid sa protektivnim i kontaktnim delovanjem, namenjen za suzbijanje prouzrokovala plamenjače u usevima krompira, paradajza, krastavca i zasadu vinove loze.

PAKOVANJE: 50 ml, 250 ml, 1 l**KOLIČINA PRIMENE:** 0,5 - 0,7 l/ha**KARENCA:** 7 dana krompir, 3 dana paradajz i krastavac, 21 dan za vinovu lozu**Cuprozin 35 WP**

cosaco
essential copper salts
AKTIVNA SUPSTANCA: Bakar u obliku bakar oksihlorida (350 g/kg preparata)

Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovala čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova u zasadima jabuke, sušenja lastara maline, plamenjače vinove loze i krompira, bakterioznog raka i šupljikavosti lišća kajsije i bakteriozne plamenjače leske.

PAKOVANJE: 25 g, 250 g, 1 kg**KOLIČINA/KONCENTRACIJA PRIMENE:** 2,2-3 kg/ha, 0,35%**KARENCA:** 7 dana krompir, 28 dana vinova loza; OVP voće**Diziram 76 WG**

Taminco

AKTIVNA SUPSTANCA: Ciram (760 g/kg preparata)

Nesistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovala čađave pegavosti lista i krastavosti plodova u zasadu jabuke, šupljikavosti lista koštičavog voća u zasadu višnje i kovrdžavosti lista breskve u zasadu breskve.

PAKOVANJE: 30 g, 1 kg**KONCENTRACIJA:** 0,2-0,3 %**KARENCA:** 21 dan jabuka, višnja i breskva**Duplex pro**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.
AKTIVNA SUPSTANCA: Protiokonazol (150 g/l preparata) + azoksistrobin (250 g/l preparata)

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovala pepelnice i fuzarioze klasa pšenice, pegavosti lista šećerne repe i prouzrokovala paleži lišća mrkve.

PAKOVANJE: 1 l**KOLIČINA PRIMENE:** 0,8-1 l/ha**KARENCA:** 14 dana mrkva, 28 dana šećerna repa; 35 dana pšenica**NOVO****Evolvente**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.
AKTIVNA SUPSTANCA: Folpet (250 g/kg preparata) + Fosetil-Aluminium (500g/kg preparata)

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, namenjen za suzbijanje prouzrokovala plamenjače u zasadu vinove loze.

PAKOVANJE: 1 kg**KOLIČINA PRIMENE:** 3-4 kg/ha**KARENCA:** Vinova loza 42 dana**Flux**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.
AKTIVNA SUPSTANCA: Fludioksonil (225 g/l preparata)

Nesistemični i kontaktni fungicid, za suzbijanje prouzrokovala skaldišnih bolesti u zasadima jabuke, kruške, breskve, šljive, višnje, kajsije i prouzrokovala sive truleži u zasadima vinove loze, maline, kupine, jagode, borovnice i usevu dinje.

PAKOVANJE: 100 ml, 1 l, 5 l**KOLIČINA PRIMENE:** 1-2l/ha**KARENCA:** 3 dana kruška, šljiva, višnja, dinja; 7

dana jabuka, breskva, kajsija, malina, kupina, jagoda, borovnica, 21 dan vinova loza

**Foltex**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Folpet (800 g/kg preparata)

Nesistemični folijarni fungicid sa protektivnim delovanjem, namenjen za suzbijanje prouzrokovala plamenjače u zasadu vinove loze, plamenjače i rdje na šljivi.

PAKOVANJE: 1 kg**KONCENTRACIJA PRIMENE:** 0,1-0,2 %**KARENCA:** 21 dan šljiva, 28 dana vinske sorte vinove loze, 56 dana stone sorte vinove loze**Fuzija plus**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Propamokarb-hidrohlorid (470 g/l preparata) + fluazinam (100 g/l preparata)


Fungicid sa preventivnim i sistemčnim delovanjem, namenjen za suzbijanje prouzrokovala crne pegavosti i plamenjače u usevu krompira i prouzrokovala plamenjače u usevu paradajza.

PAKOVANJE: 300 ml, 1 l**KOLIČINA PRIMENE:** 2 l/ha**KARENCA:** 7 dana krompir i paradajz**Galileo**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Ditianon (700 g/kg preparata)

Folijarni fungicid sa protektivnim i delimično kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovala čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova u zasadima jabuke i kruške, prouzrokovala kovrdžavosti lista breskve i prouzrokovala šupljikavosti lista u zasadu breskve i prouzrokovala sive pegavosti i šupljikavosti lišća u zasadima višnje i kajsije.

PAKOVANJE: 20g, 500 g, 1 kg, 5 kg**KONCENTRACIJA PRIMENE:** 0,05-0,075%**KARENCA:** 42 dana-kruška, 35 dana-jabuka, višnja, kajsija; OVP-breskva**Galoksid**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: bakar iz bakar hidroksida (500 g/kg preparata) / (770 g/kg bakar-hidroksida)

Nesistemični preventivni fungicid i baktericid, namenjen za suzbijanje prouzrokovala pegavosti lista šećerne repe, kao, prouzrokovala kestenjaste pegavosti izdanaka maline i kupine i prouzrokovala plamenjače i bakteriozne plamenjače paprike.

PAKOVANJE: 1 kg, 10 kg**KOLIČINA/KONCENTRACIJA PRIMENE:** 1,7-2 kg/ha, 0,3-0,35 %**KARENCA:** 21 dan-šećerna repa i paprika, OVP - malina i kupina**NOVO****Galoksid flow**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Bakar – iz Bakar hidroksida (300 g/kg preparata)

Nesistemični preventivni fungicid i baktericid, namenjen za suzbijanje prouzrokovala pegavosti lista u usevu šećerne repe, crne truleži i plamenjače kupusa, plamenjače krastavca, plamenjače i purpurne pegavosti luka.

PAKOVANJE: 1 l**KOLIČINA PRIMENE:** 1,8-3,3 l/ha**KARENCA:** Krastavac - 5 dana, kupus - 7 dana; šećerna repa - 21 dan; luk - 28 dana.**Insajder**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Fluopiram (500 g/l preparata)

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem, namenjen za suzbijanje prouzrokovala pepelnice u zasadu vinove loze i prouzrokovala pepelnice i čađave pegavosti lista i krastavosti plodova u zasadu jabuke, prouzrokovala sušenja cvetova, rodni grančica, mrke truleži plodova breskve i prouzrokovala kestenjaste pegavosti izdanaka maline i sive truleži maline.

PAKOVANJE: 300 ml, 1 l**KOLIČINA/KONCENTRACIJA PRIMENE:** 0,3-0,4 l/ha; 0,02-0,05 %**KARENCA:** 3 dana stone sorte vinove loze, 7 dana za malinu i breskvu, 21 dan vinske sorte vinove loze, 28 dana jabuka**Kardinal**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Fluazinam (500 g/l preparata)

Preventivni fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovala čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke, crne pegavosti jabuke, plamenjače krompira i vinove loze.

PAKOVANJE: 200 ml, 1 l, 5 l**KOLIČINA /KONCENTRACIJA PRIMENE:** 0,3-0,4 l/ha/0,06-0,15%**KARENCA:** 7 dana krompir, 21 dan vinova loza, 28 dana jabuka



Legat SP


GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Fosetil-aluminijum (800 g/kg preparata)

Sistemični protektivni i kurativni fungicid za suzbijanje prouzrokovaca plamenjače krastavca, tikve, tikvice, bundeve, dinje i lubenice, plamenjače korenovog vrata jagode, plamenjače vinove loze i bakterijske plamenjače jabuke.

PAKOVANJE: 30g, 1 kg **KOLIČINA/KONCENTRACIJA PRIMENE:** 2-4,5 kg/ha, 0,25-0,37%

KARENCA: 4 dana krastavac, tikva, tikvica, budeva, dinja i lubenica, 14 dana jagoda, 21 dan stone sorte vinove loze, 30 dana jabuka, 42 dana vinske sorte vinove loze



Libreto


GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Fenheksamid (500 g/l preparata)

Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovaca sive truleži u zasadima vinove loze, maline, kupine, jagode i borovnice.

PAKOVANJE: 1 l **KOLIČINA PRIMENE:** 1-1,5 /ha

KARENCA: 3 dana malina, kupina, jagoda, borovnica; 7 dana stone sorte vinove loze; 21 dan vinske sorte vinove loze



Lunar


GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Krezoksim-metil (500 g/l preparata)

Sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovaca pepelnice jabuke i pepelnice vinove loze.

PAKOVANJE: 100 ml, 200 ml, 1 l **KOLIČINA PRIMENE:** 0,2 l/ha

KARENCA: 21 dana jabuka, 35 dana vinova loza



Magnetic


GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Propamokarb-hidroklorid (625 g/l preparata) + fluopikolid (62,5 g/l preparata)

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem, namenjen za suzbijanje prouzrokovaca plamenjače u usevima krastavca, tikve, tikvice, bundeve, dinje, lubenice, paradajza, plavog patlidžana, krompira, crnog luka, praziluka, vlašca i kupusa.

PAKOVANJE: 300 ml, 1 l **KOLIČINA PRIMENE:** 1,2-1,6 l/ha

KARENCA: 3 dana krastavac, tikva, tikvica, bundeva, dinja, lubenica; 7 dana paradajz, plavi patlidžan, krompir, crni luk, praziluk i vlašac



Metod 480 SC


GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Kaptan (480 g/l preparata)

Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovaca čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke i kruške, šupljikavosti lista koštičavog voća, plamenjače šljive, plamenjače vinove loze, sive truleži i lisne pegavosti jagode i prouzrokovaca kestenjaste pegavosti izdanaka maline i kupine.

PAKOVANJE: 300 ml, 1 l, 5 l **KOLIČINA PRIMENE:** 2-3 l/ha

KARENCA: 7 dana malina i kupina; 21 dan jabučasto, koštičavo voće i jagoda; 35 dana vinova loza



Neon


GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Ciprodinil (300 g/l preparata)

Sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovaca čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke i sušenja cvetova i grančica i mrke truleži plodova višnje, šljive, breskve i kajsije.

PAKOVANJE: 50 ml, 300 ml, 1 l **KOLIČINA PRIMENE:** 0,5-0,7 l/ha

KARENCA: 14 dana višnja, šljiva, breskva, kajsija; 28 dana jabuka



Pehar


GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Pirimetanil (400 g/l preparata)

Sistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovaca čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke i kruške, truleži plodova kruške, sušenja cvetova i grančica i mrke truleži plodova, breskve, kajsije i trešnje, sive truleži paprike, paradajza, plavog patlidžana, jagode, maline, kupine, borovnice i vinove loze.

PAKOVANJE: 100 ml, 300 ml, 1 l **KOLIČINA/KONCENTRACIJA PRIMENE:** 1-2 l/ha; 0,2 %

KARENCA: 14 dana jagoda, malina, kupina, borovnica, paprika, paradajz, plavi patlidžan; 21 dan breskva, kajsija, trešnja; 28 dana jabuka i kruška; 35 dana vinova loza



Plavo ulje

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Bakar oksihlorid (100 g/l preparata) + mineralno ulje (700 g/l preparata)

Kontaktni insekto-akaro-fungicid za zimsko prskanje voća i suzbijanje prezimljujućih stadijuma štetnih insekata: štitastih vaši, crvene voćne grinje i lisnih vaši, kao i prouzrokovaca bolesti kovrdžavost lista breskve i prouzrokovaca kestenjaste pegavosti izdanaka maline i kupine.

PAKOVANJE: 200 ml, 1 l **KONCENTRACIJA:** 2 – 3 %

KARENCA: OVP jabuka, breskva, malina, kupina, šljiva



Promesa

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Azoksistrobin (250 g/l preparata)

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovaca pepelnice i plamenjače vinove loze, kestenjaste pegavosti izdanaka maline, kupine, borovnice, ribizle, sive pegavosti lista jagode, plamenjače i crne pegavosti krompira, paradajza i plavog patlidžana, antraknoze paprike (na otvorenom), plamenjače krastavca, tikve, tikvice, bundeve, dinje, lubenice, salate, pepelnice i crne pegavosti mrkve, antraknoze graška i pepelnice pšenice.

PAKOVANJE: 50 ml, 200 ml, 1 l **KOLIČINA/KONCENTRACIJA PRIMENE:** 0,75-1 l/ha; 0,075%

KARENCA: 3 dana paradajz, plavi patlidžan, paprika (na otvorenom); 4 dana krastavac, tikva, tikvica, bundeva, dinja, lubenica; 7 dana mrkva, salata; 10 dana, malina, jagoda, kupina, borovnica, ribizla; 14 dana krompir, grašak; 21 dan vinova loza; 35 dana pšenica



Pylon

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Protiokonazol (250 g/l preparata)

Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovaca pepelnice, rđe i truleži klasa u usevu pšenice, prouzrokovaca rđe i truleži klasa u usevu ječma i sive pegavosti lista u usevu šećerne repe.

PAKOVANJE: 1 l, 5 l **KOLIČINA PRIMENE:** 0,4-0,8 l/ha

KARENCA: 35 dana-pšenica, ječam i šećerna repa



Pylon plus

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Protiokonazol (143 g/l preparata) + azoksistrobin (111,9 g/l preparata) + trifloksistrobin (111,2 g/l preparata)

Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovaca pepelnice, rđe i truleži klasa u usevu pšenice.

PAKOVANJE: 1 l, 5 l **KOLIČINA PRIMENE:** 0,5-0,7 l/ha

KARENCA: 35 dana



Sekvenca

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Difenokonazol (250 g/l preparata)

Sistemični protektivni i kurativni fungicid za suzbijanje prouzrokovaca pepelnice i čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke i kruške, pepelnice vinove loze i dunje, sušenja cvetova i grančica i mrke truleži plodova višnje, šljive, kajsije i borovnice, kestenjaste pegavosti izdanaka maline i kupine, crne pegavosti krompira, paradajza, plavog patlidžana, paprike (na otvorenom), mrkve, peršuna (za list), celera, paštrnaka, sive pegavosti lišća šećerne repe i cvekle.

PAKOVANJE: 50 ml, 200 ml, 1 l **KOLIČINA/KONCENTRACIJA PRIMENE:** 0,2-0,6 l/ha, 0,012-0,03 %

KARENCA: 7 dana paradajz, plavi patlidžan, paprika (na otvorenom), 14 dana krompir, šećerna repa, mrkva, celer, peršun (za list), paštrnak, dunja, malina, kupina, 21 dan vinova loza, 28 dana jabuka, kruška, cvekla, OVP višnja, šljiva, kajsija, borovnica.



Vokal C

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Cimoksanil (120 g/l preparata)

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem, namenjen za suzbijanje prouzrokovaca plamenjače u usevima krompira i paradajza i zasadu vinove loze.

PAKOVANJE: 100 ml, 1 l **KOLIČINA PRIMENE:** 0,8-1,2 l/ha

KARENCA: 7 dana krompir i paradajz, 21 dan vinova loza

**Abastate**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.
AKTIVNA SUPSTANCA: Abamektin (18 g/l preparata)

Insektio-akaricid kontaktnog i digestivnog delovanja koji se primenjuje za suzbijanje običnog paučinaru u paradajzu u zaštićenom prostoru i tripsa u ukrasnom bilju u zaštićenom prostoru. Primenjuje se sam ili u kombinaciji sa rafinisanim mineralnim uljem ili aduvantom NuFilm 17.

PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 1 l, 5 l**KONCENTRACIJA PRIMENE:** 0,05%**KARENCA:** 3 dana paradajz**NOVO****Adut**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.
AKTIVNA SUPSTANCA: Acekvinocil (164 g/l preparata)

Kontaktni akaricid namenjen za suzbijanje grinja u zasadima jabuke i višnje, kao i u usevima paradajza u zaštićenom prostoru.

PAKOVANJE: 1 l**KOLIČINA PRIMENE:** 1,0-1,8 l/ha**KARENCA:** 3 dana za paradajz, 21 dan za višnju i 30 dana za jabuku**Cipkord 20 EC**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.
AKTIVNA SUPSTANCA: Cipermetrin (200 g/l preparata)

Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje grozdovog smotavca u vinovoj lozi, jabukinog smotavca u zasadu jabuke, kruškine buve u zasadu kruške, lisnih sovica i velikog kupusara u kupusnjačama, bele leptiraste vaši u usevima krastavca i paradajza u polju, krompirove zlatice u usevu krompira i lisnih sovica u usevu šećerne repe.

PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 1 l**KONCENTRACIJA/KOLIČINA PRIMENE:** 0,015-0,03 %; 0,15-0,3 l/ha**KARENCA:** 14 dana krompir, krastavac, paradajz; 28 dana voće, kupusnjače; 35 dana šećerna repa; 56 dana vinova loza**Etiol ultra**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.
AKTIVNA SUPSTANCA: Deltametrin (25 g/l preparata)

Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, namenjen za suzbijanje skladišnih štetočina (žitni moljac, žitni žižak, brašnar) u merkantilnoj i semenskoj pšenici i kukuruzu.

PAKOVANJE: 100 ml, 300 ml**KOLIČINA PRIMENE:** 10 ml/1 l vode/t merkantilnog zrna; 40 ml/1 l vode/t semenskog zrna**KARENCA:** 7 dana**Galition ultra**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.
AKTIVNA SUPSTANCA: Teflutrín (5 g/kg preparata)

Nesistemični insekticid sa kontaktnim i inhalacionim delovanjem koji se koristi za suzbijanje larvi žičnjaka u usevima krompira, paradajza i plavog patlidžana.

PAKOVANJE: 1 kg**KOLIČINA PRIMENE:** 12-15 kg/ha**KARENCA:** OVP**Galmin**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.
AKTIVNA SUPSTANCA: Mineralno (parafinsko) ulje (940 g/kg preparata)

Insekticid i akaricid za zimsko i letnje tretiranje voćaka i vinove loze. Primenjuje se u fazama razvoja pupoljaka kada su zeleni listići do 5 mm za suzbijanje kruškine buve, vaši, grinja, ili tokom vegetacije – letnje prskanje kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu.

PAKOVANJE: 1 l, 5 l, 10 l, 200 l**KOLIČINA/KONCENTRACIJA PRIMENE:** 1-5%, 20 l/ha**KARENCA:** 21 dan letnje tretiranje, a zimsko tretiranje – OVP**Harpun**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.
AKTIVNA SUPSTANCA: Piriproksifen (100 g/l preparata)

Kontaktni i digestivni insekticid za suzbijanje jabukinog smotavca u zasadu jabuke, kruškine buve u zasadu kruške, breskvinog smotavca u zasadu breskve, bele leptiraste vaši u paradajzu u zaštićenom prostoru i plavom patlidžanu, jabukinog i breskvinog smotavca u zasadu kajsije.

PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 1 l, 5 l**KONCENTRACIJA:** 0,04-0,15%**KARENCA:** 3 dana paradajz, plavi patlidžan; 14 dana kajsija; 28 dana jabuka, kruška, breskva

**Karika**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Acetamiprid (80 g/l preparata) + Deltametrin (12,5 g/l preparata)Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Koristi se za suzbijanje biljnih vašiju u zasadi-
ma jabuke, šljivine ose u zasadima šljive i lukove muve u usevima crnog luka i vlašca i za suzbijanje repičinog
sjajnika u uljanoj repici.**PAKOVANJE:** 50 ml, 1 l**KOLIČINA PRIMENE:** 0,3-1 l/ha**KARENCA:** 14 dana za crni luk, vlašac; 28 dana za jabuku i šljivu; 42 dana uljana repica**Kentaur**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Piridaben (200 g/l preparata)Kontaktni insekticid i akaricid namenjen za suzbijanje grinja u zasadima jabuke, i usevima paradajza u
zaštićenom prostoru.**PAKOVANJE:** 50 ml, 300 ml, 1 l**KONCENTRACIJA PRIMENE:** 0,05 %**KARENCA:** 14 dana za jabuku, 3 dana za paradajz**Kozak**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Lambda-cihalotrin (50 g/l preparata)Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje smotavca u jabuci i dunji, soveca u kupusu i
šećernoj repi; cvetojeda u malini, jagodi, kupini i borovnici, biljnih vaši u tikvi, tikvici, bundevi, dinji, lubenici,
boraniji, pasulju, bobu, sočivu, grašku, stočnom grašku, salati, spanaću, blitvi, zelju, rukoli, radiču, endiviji i
matovilcu; lešnikovog surlaša i biljnih vaši u leski; lukove muve i kupusnih soveca u salati, spanaću, blitvi, zelju,
rukoli, radiču, endiviji, matovilcu, karfiolu, brokoli, prokelju, rotkvi, rotkvici i slačici, žitne pijavice u pšenici.**PAKOVANJE:** 50 ml, 300 ml, 1 l, 5 l**KOLIČINA/KONCENTRACIJA PRIMENE:** 0,15-0,2 l/ha; 0,01-0,03%**KARENCA:** 3 dana tikva, tikvica, bundeva, dinja, lubenica; 7 dana salata, spanać, blitva, zelje, rukola, radič,
endivija, matovilac, karfiol, brokoli, prokelj, rotkva, rotkvica, slačica, leska; 14 dana jabuka, dunja, kupus,
šećerna repa, boranija, pasulj, bob, sočivo, grašak, stočni grašak; 28 dana malina, jagoda, kupina i borovnica;
35 dana pšenica**NOVO****Laguna**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Hlorantraniliprol (200 g/l preparata)Larvicidni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen za suzbijanje jabukinog smotavca
u zasadima jabuke, grozdovog smotavca u zasadima vinove loze, kupusovog moljca u usevu kupusa, kuku-
rznog plamenca u usevima merkantilnog i semenskog kukuruza, krompirove zlatice u usevu krompira,
pamukove sovice i moljca paradajza u usevima paradajza.**PAKOVANJE:** 50 ml, 1 l**KOLIČINA/KONCENTRACIJA PRIMENE:** 0,05-0,2 l/ha; 0,015-0,02%**KARENCA:** 1 dan za paradajz, 3 dana za stone sorte grožđa, 7 dana za kupus, 14 dana za jabuku, krompir i
kukuruz, 30 dana za vinske sorte grožđa**Polux**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Deltametrin (25 g/l preparata)Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Primenjuje se u vinogradarstvu, voćarstvu,
ratarstvu i povrtarstvu za suzbijanje biljnih vaši; lisnih minera; jabukinog, breskvinog, grozdovog smotavca;
kruškine buve; žitne pijavice; trešnjine, maslinine, mrkvine i lukove muve; šljivine, kruškine i repičine ose;
bele leptiraste vaši; krompirove zlatice; kukuruznog plamenca; kupusnog moljca; zelene i braon mramoraste
stenice; duvanovog tripsa; podgrizajućih i lisnih soveca i gubara, žutotrbe, hrastovog savijača i mrazovca u
šumskim sastojinama.**PAKOVANJE:** 50 ml, 200 ml, 1 l, 5 l**KOLIČINA/KONCENTRACIJA PRIMENE:** 0,02-0,05% u voćarstvu, izuzev za lesku 0,4-0,5 l/ha; 0,2-0,5 l/ha u
ratarstvu i povrtarstvu; 0,4 l/ha + 10 l/ha nafte (D1) za šumske sastojine**KARENCA:** 3 dana plavi patlidžan, tikva, tikvica, bundeva, lubenica, kajsiya, jagoda, paprika; 7 dana krompir,
jabuka, kruška, paradajz, krastavac, praziluk, vlašac, mrkva, peršun, celer, paštrnak, boranija, pasulj, bob, soči-
vo, grašak, stočni grašak, salata, zelje, rukola, motovilac, kelj, karfiol, brokoli, rotkva, rotkvica; 14 dana kukuruz,
breskva, trešnja, višnja, šljiva, hmelj; 21 dan vinova loza; 28 dana duvan, maslina; 30 dana leska, cvekla; 35 dana
strna žita; 42 dana uljana repica.**Talent**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Flonikamid (500 g/kg preparata)Insekticid sa sistemskim i translaminarnim delovanjem, namenjen za suzbijanje biljnih vašiju u zasadima
jabuke, dunje, višnje i breskve i u usevima paprike, paradajza i graška.**PAKOVANJE:** 1,4 g, 14 g, 140 g**KOLIČINA PRIMENE:** 0,06-0,14 kg/ha**KARENCA:** 1 dan paradajz; 5 dana paprika; 14 dana višnja i grašak; 21 dan jabuka, dunja i breskva

**Tektan**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.
AKTIVNA SUPSTANCA: Teflutrín (15 g/kg preparata)

Insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina u usevima suncokreta, kukuruza, šećerne repe, mrkve, celera, peršuna.

PAKOVANJE: 250 g, 1 kg, 20 kg**KOLIČINA PRIMENE:** 5-10 kg/ha**KARENCA:** OVP**Tonus**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.
AKTIVNA SUPSTANCA: Acetamiprid (200 g/kg preparata)

Sistemični insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje krompirove zlatice, lucerkine bube, graškovo žižka, tripsa, malinog cvetojeda, lukove i trešnjine muve, biljnih vaši u povrtarstvu, voćarstvu i duvanu.

PAKOVANJE: 2,5 g, 25 g, 100 g, 250 g, 1 kg**KOLIČINA/KONCENTRACIJA PRIMENE:** 0,125-0,4 kg/ha / 0,02-0,025%

KARENCA: 3 dana tikva, tikvica, bundeva, dinja, lubenica; 7 dana plavi patlidžan, zelje, rukola, radič, matovilac, karfiol, brokoli, prokelj; 14 dana krompir, kupus, duvan, paprika, grašak, boranija, pasulj, bob, stočni grašak, malina, jagoda, kajsija, višnja, luk i breskva; 28 dana jabuka, lucerka, leska

**Traper**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.
AKTIVNA SUPSTANCA: Spinosad (240 g/l preparata)

Sistemični insekticid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, namenjen za suzbijanje jabukinog smotavca u zasadu jabuke, tripsa u zasadu breskve, cvetojeda u zasadu maline, krompirove zlatice u usevu krompira, kalifornijskog tripsa u paprici u zaštićenom prostoru i tripsa u krastavcu u zaštićenom prostoru.

PAKOVANJE: 50 ml, 1 l**KOLIČINA/KONCENTRACIJA PRIMENE:** 0,2-0,6 l/ha; 0,03-0,05%**KARENCA:** 3 dana za malinu i krastavac; 7 dana za jabuku, breskvu i papriku; 14 dana za krompir**Triton**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.
AKTIVNA SUPSTANCA: Emamektin benzoat (9,5 g/l preparata)

Nesistemični, digestivni insekticid namenjen za suzbijanje jabukinog smotavca u zasadima jabuke i dunje, breskvinog smotavca u zasadima breskve i kajsije, šljivinog smotavca u zasadu šljive, pamukove sovice i moljca paradajza u usevima paradajza i plavog patlidžana, pamukove sovice u usevu paprike i kupusovog moljca u usevu kupusa.

PAKOVANJE: 250 ml, 1 l**KOLIČINA/KONCENTRACIJA PRIMENE:** 1,5-2 l/ha; 0,25-0,3 % + 0,25% mineralnog ulja (Galmin)**KARENCA:** 3 dana paradajz, plavi patlidžan, paprika, kupus; 7 dana jabuka, dunja, breskva, kajsija i šljiva.

Biopesticidi

**Limocide**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.
AKTIVNA SUPSTANCA: Ulje pomorandže (60 g/l preparata)

Biopreparat koji ima fungicidno i insekticidno delovanje. Kao insekticid deluje kontaktno, tako što fizički sprečava respiraciju insekata. Tečnost sa ultra niskim površinskim naponom prodire u respiratorni sistem insekata, oslobađajući aktivni sastojak i istovremeno blokirajući ulazak vazduha. Kao fungicid deluje takođe kontaktno i preventivno. Na fitopatogene gljive deluje tako što isušuje zaštitne membrane površinskih gljivičnih micelija (hifa), sporangija i spora koje se razgrađuju i izlažu isušivanju atmosfere. Koristi se za suzbijanje prouzrokovaca biljnih bolesti i štetnih insekata u zasadima kruške, vinove loze, jagode i usevima kupusa, krastavca, kornišona, dinje, tikvice, paradajza, plavog patlidžana, paprike, praziluka, crnog luka, zelene salate, mrkve i peršuna.

PAKOVANJE: 100ml, 1 l**KOLIČINA PRIMENE:** 1,6-6 l/ha**KARENCA:** 1 dan za sve useve/zasade**Ecothrin 5 SC**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.
AKTIVNA SUPSTANCA: Piretrini – ekstrakt iz *Chrysanthemum cinerariaefolium* (50 g/l preparata)

Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, namenjen za suzbijanje leptirastih vaši i moljca paradajza u usevu paradajza u zaštićenom prostoru; krompirove zlatice, leptirastih vaši i tripsa u usevu plavog patlidžana u zaštićenom prostoru; duvanovog tripsa i vaši u ukrasnom bilju.

PAKOVANJE: 1 l**KOLIČINA PRIMENE:** 0,3-1,08 l/ha**KARENCA:** 2 dana za paradajz i plavi patlidžan u zaštićenom prostoru

**Barricade EC 20**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Cipermetrin (200 g/l preparata)

Kontaktni insekticid za suzbijanje odraslih formi muva na farmama i ekonomskim dvorištima.

PAKOVANJE: 50 ml **KOLIČINA PRIMENE:** 50 ml u 5 -10 l vode
KARENCA: za meso tretiranih životinja 28 dana, za mleko 7 dana**Hektor**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Ciromazin (500 g/kg preparata)

Insekticid – larvicid, namenjen za suzbijanje larvi domaće i stajske muve u objektima za uzgoj domaćih životinja i ekonomskim dvorištima.

PAKOVANJE: 5 kg **KOLIČINA PRIMENE:** 10 g u 10 l vode na 10 m²**Kontakt**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Deltametrin (25 g/l preparata) + piperonil butoksid (225 g/l preparata)

Kontaktni insekticid za suzbijanje bubašvaba i skladišnih štetočina.

PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 1 l
KOLIČINA PRIMENE: 50 ml u 5 -10 litara vode na 100m²**Muver**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Tiametoksam (100 g/kg preparata) + Z-(9)- trikosen (0,5 g/kg preparata)

Sistemični insekticid za suzbijanje muva u zatvorenom prostoru, u objektima gde se domaće životinje drže i čuvaju.

PAKOVANJE: 100 g, 400 g
KOLIČINA PRIMENE: 100 g u 80 ml vode - premazivanjem**Nadzor**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Lambda - cihalotrin (100 g/l preparata)

Kontaktni insekticid za suzbijanje krpelja i bubašvaba.

PAKOVANJE: 50 ml
KOLIČINA PRIMENE: 0,06% uz upotrebu 300 l rastvora/ha za suzbijanje krpelja; 20-40 ml u 10 l vode za suzbijanje bubašvaba**Nadzor 10 WP**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Lambda cihalotrin (100 g/kg preparata)

Kontaktni insekticid za suzbijanje muva, mrava i bubašvaba.

PAKOVANJE: 50 g
KOLIČINA PRIMENE: 12,5 g preparata u 1,5 l vode za suzbijanje bubašvaba, 12,5 g preparata u 2,5 l vode za suzbijanje mrava i muva**Ratomide pasta**

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Brodifakum (0,0025% preparata)

Rodenticid u obliku mekog mamka za suzbijanje kućnog miša i sivog pacova.

PAKOVANJE: 150 g
KOLIČINA PRIMENE: 20-40 g / 100-200 g rodenticida u kutijama za mamke

Regulatori rasta



Adversis


GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Etefon (480 g/l preparata)

Regulator rasta, koji ubrzava i ujednačava sazrevanje plodova višnje.

PAKOVANJE: 1 l, 5l

KOLIČINA PRIMENE: 0,23 l/m visine krošnje/ha

KARENCA: 7 dana


Trident


GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Trineksapak-etil (250 g/l preparata)

Regulator rasta za primenu u usevu pšenice, koji očvršćuje stabljiku, smanjuje visinu biljaka i povećava masu korena sprečavajući poganje.

PAKOVANJE: 1 l

KOLIČINA PRIMENE: 0,3-0,5 l/ha

KARENCA: OVP

POMOĆNA SREDSTVA



Nu - Film 17


AKTIVNA SUPSTANCA: Pinolein (960 g/l preparata)

Nu-film 17 se koristi kao pomoćno sredstvo (ađuvant), direktnim mešanjem sa sredstvima za zaštitu bilja u rezervoaru uređaja za tretiranje.

PAKOVANJE: 100 ml, 1 l

KOLIČINA/KONCENTRACIJA PRIMENE: 0,7-1,5 l/ha

KARENCA: Usklađena sa sredstvima za zaštitu bilja sa kojima se primenjuje u kombinaciji.


Alteox T Prima


GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

AKTIVNA SUPSTANCA: Izodecil alkohol etoksilat (900 g/l preparata)

Univerzalni okvašivač za poboljšavanje performansi herbicida iz grupe sulfonilurea. Kao surfaktant poboljšava kvašljivost, trajnost vlaženja i efikasnost herbicida sa kojim se primenjuje.

PAKOVANJE: 200 ml, 1 l

KONCENTRACIJA: 0,2 %

KARENCA: Uslovljeno herbicidom sa kojim se koristi

ISHRANA BILJAKA - BIOSTIMULATORI



Fitopin®

Fitopin je biostimulator namenjen za otklanjanje posledica izazvanih biotičkim i abiotičkim stresom kod biljaka. Aktivna komponenta preparata je prirodni brasinolid koja pripada grupi hormona brasinosteroida. To su jedinjenja koja biljka sama sintetizuje, a odgovorni su za rast ćelije i ćelijsku deobu. **Fitopin** utiče na rad drugih hormona pa ih tako vraća u ravnotežu, a biljka uspostavlja normalan proces rasta i razvoja.

Količina primene: Folijarno 50-100 ml/ha zavisno od kulture


**Foligal Feed Super**

GALENICA - FITOFARMACIJA a.d.

Kompleksno tečno NPK đubrivo sastava 8:8:6 sa mikroelementima. Sastav odgovara univerzalnoj primeni u toku cele vegetacione godine. Koristi se za đubrenje različitih useva/zasada (ratarstvo, povrtarstvo, voćarstvo i hortikultura) na različitim tipovima zemljišta.

Količina primene: 1-3 l/ha

Koristi se tretiranjem preko lista.

Utrošak vode je standardan za kulturu u kojoj se koristi.

**Foligal Feed CalMax**

GALENICA - FITOFARMACIJA a.d.

Tečno đubrivo, koje sadrži 15,3 % kalcijuma sa mikroelementima.

Koristi se za ishranu različitih biljnih vrsta i to naročito za vrste koje imaju povećane potrebe za kalcijumom (povrće-paprika, paradajz, voće-jabuka, ratarstvo-krompir).

Kalcijum je vrlo bitan element koji doprinosi strukturi ćelijskih membrana i daje strukturnu čvrstoću plodova i same biljke. Nedostatak i blokada kalcijuma u zemljištu može se nadomestiti samo folijarnim tretmanom i potrebno je tokom cele vegetacione sezone u kontinuitetu vršiti prihranu kalcijumom preko lista.

Količina primene: 2-3 l/ha

Koristi se tretiranjem preko lista i u sistemima za fertigaciju.

Utrošak vode je standardan za kulturu u kojoj se koristi.

**Foligal Feed Bor 150**

GALENICA - FITOFARMACIJA a.d.

Folijarno đubrivo sa visokom koncentracijom bora 150 g/l u obliku bor etanol amina. Bor se u navedenom organskom kompleksu olakšano usvaja u biljno tkivo i transportuje unutar biljke. Direktno utiče na sintezu šećera, poboljšava oplodnju i zamatanje plodova. Koristi se za prihranu različitih biljnih vrsta u voćarstvu, povrtarstvu, ratarstvu i na zemljištima deficitarnim borom, na otvorenom i u zaštićenom prostoru.

Količina primene: 1-2 l/ha

Koristi se tretiranjem preko lista.

Utrošak vode je standardan za kulturu u kojoj se koristi.

**Foligal Feed Man 500**

GALENICA - FITOFARMACIJA a.d.

Đubrivo sa visokim sadržajem mikroelementa mangan. Mangan učestvuje u usvajanju azota i sintezi organskih kiselina. Primjenjuje se folijarno, ali i preko sistema za navodnjavanje. Fiziološki pojačava otpornost biljke na zemljišne patogene. Koristi se za prihranu različitih biljnih vrsta u voćarstvu, povrtarstvu, ratarstvu i na zemljištima deficitarnim manganom, na otvorenom i u zaštićenom prostoru.

Količina primene: 1-2 l/ha

Koristi se tretiranjem preko lista i u sistemima za fertigaciju.

Utrošak vode je standardan za kulturu u kojoj se koristi.

**Foligal Feed Mag 500**

GALENICA - FITOFARMACIJA a.d.

Neorgansko đubrivo sa magnezijumom u obliku magnezijum hidroksida. Magnezijum je neophodan mineral za rast i razvoj biljaka, igra ključnu ulogu u izgradnji hlorofila, od koga zavisi fotosinteza. Bez prisutog izvora magnezijuma, biljka ne može da raste. Koristi se za prihranu različitih biljnih vrsta u voćarstvu, povrtarstvu, ratarstvu i na zemljištima deficitarnim magnezijumom, na otvorenom i u zaštićenom prostoru.

Količina primene: 2-3 l/ha

Koristi se tretiranjem preko lista i u sistemima za fertigaciju.

Utrošak vode je standardan za kulturu u kojoj se koristi.

**Foligal Feed Cink 700**

GALENICA - FITOFARMACIJA a.d.

Neorgansko đubrivo sa visokim sadržajem cinka 700 g/l koji je ključan faktor u sintezi auksina koji reguliše rast biljke. Foligal Feed Cink 700 se koristi za prihranu različitih biljnih vrsta u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu, na zemljištima deficitarnim u cinku ili kod biljnih vrsta koje imaju povećane potrebe za cinkom, na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru.

Količina primene: 1-2 l/ha

Koristi se tretiranjem preko lista.

Utrošak vode je standardan za kulturu u kojoj se koristi.





Foligal Feed CalPit

Foligal Feed CalPit je tečno đubrivo sa visokim sadržajem kalcijuma 160 g/l koje se koristi u proizvodnji povrtarsko-ratarskih i voćarsko-vinogradarskih kultura na svim tipovima zemljišta.

Foligal Feed CalPit je posebno formulisan preparat sa rastvorom kalcijum hlorida koji pruža maksimalnu bezbednost prema plodovima i visoku efikasnost. Folijarnom primenom kontroliše i smanjuje pojavu poremećaja u plodovima izazvanih nedostatkom kalcijuma, pre svega gorke pege na jabukama i propadanje tkiva vršnih delova povrtarskih kultura.

Poboljšava kvalitet plodova, jača ćelijske zidove i omogućava bolje skladištenje plodova.

Količina primene: 2-3 l/ha

Koristi se tretiranjem preko lista.

Utrošak vode je standardan za kulturu u kojoj se koristi.



Foligal Turbo P

Kompletno folijarno đubrivo namenjeno za postizanje maksimalnih prinosa u strnim žitima. Proizvod sadrži specijalan odnos mikro i makro elemenata kao i specifične biohormone. Proizvod je kompatibilan sa fungicidima i insekticidima koji se preporučuju u programu zaštite pšenice. Može se primeniti od prvog kolenca do cvetanja useva.

Količina primene: 2-3 l/ha



Foligal Turbo K

Specijalizovano folijarno đubrivo sa mikro i makro elementima sa dodatkom biohormona za ishranu kukuruza. Primenom Foligal Turbo K pokreću se najznačajniji mehanizmi u biljci, a koji su odgovorni za formiranje visokog prinosa.

Primenjuje se od 2. do 8. lista u usevu kukuruza.

Količina primene: Folijarno 1-2 l/ha



Foligal Turbo S

Folijarno đubrivo namenjeno ishrani soje i suncokreta. Uljane kulture imaju posebne potrebe za hranivima da bi ostvarile dobar odnos i prinosa i kvaliteta zrna. Proizvod sadrži biohormone uz poseban odnos azota, sumpora, kalijuma, mangana, molibdena, cinka i organske materije.

Primenjuje se u usevu suncokreta u vazi 2-3 para listova i u usevu soje od nicanja do cvetanja.

Može se primeniti sa graminicidima u usevu suncokreta i soje.

Količina primene: Folijarno 2-3 l/ha



Foligal **TURBO**



Za bogat i kvalitetan rod!



Solugal Start NPK 11-40-11+ME

Solugal Start NPK 11-40-11+ME je starter đubrivo za intenzivno formiranje korenovog sistema. Đubrivo je bogato fosforom (P), što pozitivno utiče na pravilan i intenzivan rast i porast korenovog sistema i doprinosi pravilnom razvoju biljke u ranim fazama. Kod povrtarskih useva koji se gaje u plastenicima i staklenicima preporučuje se upotreba u fazi proizvodnje rasada i prvim fazama po rasađivanju. Solugal Start NPK 11-40-11+ME se koristi za pravilno formiranje generativnih organa posebno u voćarskoj i povrtarskoj proizvodnji.

Količina primene:

Fertigacija 0,5-2,5 g/biljci/nedeljno zavisno od kulture.

Folijarno 2-3 kg/ha.

Može se upotrebiti više puta u toku vegetacione sezone.

Utrošak vode je standardan za kulturu u kojoj se koristi.



Solugal Vegetative NPK 24-10-10+2MgO+ME

Solugal Vegetative NPK 24-10-10+2MgO+ME je đubrivo za intenzivan vegetativni porast. Đubrivo je bogato azotom (N), što doprinosi intenzivnom vegetativnom porastu. Moguća je upotreba u svim usevima, ali je naročito značajna kada želimo da obezbedimo potrebnu lisnu površinu kod ratarskih useva (strna žita i kukuruz).

Količina primene:

Fertigacija 0,5-2,5 g/biljci/nedeljno zavisno od kulture.

Folijarno 2-3 kg/ha.

Može se upotrebiti više puta u toku vegetacione sezone.

Utrošak vode je standardan za kulturu u kojoj se koristi.



Solugal Universal NPK 20-20-20+ME

Solugal Universal NPK 20-20-20+ME je đubrivo sa univerzalnom formulacijom koja može da se koristi u svim fazama razvoja biljaka. Može se upotrebiti folijarno i fertigacijom. Koristi se u svim poljoprivrednim usevima/zasadima (ratarstvo, povrtarstvo, voćarstvo, hortikultura).

Količina primene: Fertigacija 0,5-2,5 g/biljci/nedeljno zavisno od kulture.

Folijarno 2-3 kg/ha.

Može se upotrebiti više puta u toku vegetacione sezone.

Utrošak vode je standardan za kulturu u kojoj se koristi.



Solugal Ripe NPK 13-5-30+2MgO+3CaO+TE

Solugal Ripe NPK 13-5-30+2MgO+3CaO+TE je đubrivo za intenzivan porast i početak plodonošenja. Naročito je pogodno za primenu kada biljke prelaze iz vegetativne u generativnu fazu razvoja, odnosno za vreme početka obrazovanja plodova i pre plodonošenja. Đubrivo je posebno bogato magnezijumom (Mg), što olakšava fotosintezu i iskorišćenje sunčeve svetlosti, a što doprinosi boljem stanju biljke posebno u uslovima kada je nemoguće usvajanje ovog elementa iz zemljišta. Upotrebljava se folijarno ili putem fertigacije.

Količina primene: Fertigacija 0,5-2,5 g/biljci/nedeljno zavisno od kulture.

Folijarno 2-3 kg/ha. Može se upotrebiti više puta u toku vegetacione sezone.

Utrošak vode je standardan za kulturu u kojoj se koristi.





Chopin Evolution

Chopin Evolution je azotno-sumporno đubrivo sa aminokiselinama. Namenjeno je za prihranu useva koji imaju povećanu potrebu za sumporom (S) (strna žita, uljana repica, lukovice, kupusnjače).

Količina primene: 3-5 l/ha.

Utrošak vode je standardan za usev u kome se koristi.

Vreme upotrebe kod strnih žita je jednokratno ili dva puta u sezoni i to u fazi bokorenja kao i u fazi početka cvetanja. Tretmani se poklapaju sa upotrebom pesticida. U usevu uljane repice pred cvetanje uz insekticidni tretman za suzbijanje repičinog sjajnika. Kod kukuruza vreme primene je u fazi porasta kukuruza 3-5 listova i drugi tretman u fazi porasta 6-10 listova. Tretmani se poklapaju sa upotrebom folijarnih herbicida u kukuruзу.

Ne meša se sa hormonskim herbicidima na bazi a.m 2,4 D.



Activev Gold

Activev Gold je aminokiselinski kompleks sa NPK sastavom za intenzivno obrazovanje plodova i smanjenje stresa usled nepovoljnih uslova sredine u svim usevima. Idealno je za uklanjanje posledica stresa kod nepovoljnih vremenskih uslova izazvanih visokom ili niskom temperaturom, vodenim deficitom, stresom usled pojave biljnih bolesti i napada štetočina, pesticidnog šoka i sl.

Količina primene je 1-3 l/ha folijarno i 3-5 l/ha fertigacijom. Utrošak vode je standardan za usev/zasad u kome se koristi. Može se upotrebiti više puta u toku vegetacije.

Posebno je značajna upotreba u kulturama sa povećanim potrebama za kalijumom (K) (paprika, paradajz, krompir) dok kod voćarskih zasada doprinosi boljem sazrevanju, boji, obliku i porastu plodova.



Activev Vegetative

Activev Vegetative je aminokiselinski kompleks sa NPK sastavom za intenzivni vegetativni porast, kao i smanjenje stresa usled nepovoljnih uslova sredine. Upotrebljava se u svim usevima/zasadima. U voćarskoj proizvodnji je posebno značajan u prvim fazama razvoja, zbog smanjenja šteta usled poznih prolećnih mrazeva. Kod povrtarskih useva doprinosi intenzivnom porastu u prvim fazama razvoja biljaka.

Količina primene je 3-5 l/ha. Utrošak vode je standardan za kulturu u kojoj se koristi. Može se upotrebiti više puta u toku vegetacije.

Utiče na smanjenje posledica stresa kod nepovoljnih vremenskih uslova izazvanih visokom ili niskom temperaturom, vodenim deficitom, stresom usled pojave biljnih bolesti i napada štetočina, pesticidnog šoka i sl.



Murtonik 19-9-27

Primenjuje se za ishranu različitih biljnih vrsta, prvenstveno ratarskih kultura, voća, povrća i vinove loze na različitim tipovima zemljišta, od momenta formiranja plodova do kraja plodonošenja. U ratarstvu i povrtarstvu se primenjuje 3-5 puta, u voćarstvu 2-3 puta, a u vinogradarstvu 2-4 puta u toku vegetacije.

Količina primene: Fertigacija 0,5-2,5 g/biljci/nedeljno u zavisnosti od kulture. Folijarno 2-4 kg/ha. Koristi se tretiranjem preko lista i putem fertigacije.



Murtonik gold 20-20-20

Primenjuje se za ishranu različitih biljnih vrsta, prvenstveno ratarskih kultura, voća, povrća i vinove loze na različitim tipovima zemljišta, od momenta formiranja plodova do kraja plodonošenja. U ratarstvu i povrtarstvu se primenjuje 3-5 puta, u voćarstvu 2-3 puta, a u vinogradarstvu 2-4 puta u toku vegetacije.

Količina primene: Fertigacija 0,5-2,5 g/biljci/nedeljno u zavisnosti od kulture. Folijarno 2-4 kg/ha. Koristi se tretiranjem preko lista i putem fertigacije.



NUTRIVIVAL
HOLLAND**Nutrivit
Potassium
Nitrate HG****Nutrivit Potassium Nitrate HG**

Kalijum Nitrat je namenjen za biljke koje imaju pojačane potrebe za kalijumom.

Preporučena količina, vreme i način primene:

Primenjuje se u voćarstvu, ratarstvu, povrtarstvu, vinogradarstvu i hortikulturi na svim tipovima zemljišta.

Primena:

- u ratarstvu i povrtarstvu, u fazi formiranja generativnih organa i u fazi plodonošenja
- u fazi sazrevanja plodova u voćarstvu i vinogradarstvu
- u fazi intenzivnog cvetanja u hortikulturi

Količina primene:

Folijarno 0,3-0,5% rastvorom (3-5 g/l vode)

Fertigacijom 20-30 kg/ha

Može se upotrebiti više puta u toku vegetacione sezone.

**Nutrivit
Potassium
Sulphate
(SOP) HG****Nutrivit Potassium Sulphate (SOP) HG**

Dvokomponentno đubrivo na bazi kalijuma i sumpora u formulaciji vodorastvorljivog praha. Primenjuje se u fenofazama razvoja sa visokim potrebama za kalijumom. Ne sadrži azot, hlor i teške metale. Može se primenjivati folijarno, kao i fertigacijom. Kompatibilan je sa većinom kristalnih NPK đubriva i može se kombinovati po potrebi sa njima. Primenjuje se za ishranu ratarskih, povrtarskih, voćarskih kultura kao i drugih poljoprivrednih kultura na svim tipovima zemljišta.

Količina primene:

Folijarno 0,3-0,5% rastvorom (3-5 g/l vode)

Fertigacijom 20-30 kg/ha

Može se upotrebiti više puta u toku vegetacione sezone.

**Nutrivit
Magnesium
Sulphate HG****Nutrivit Magnesium Sulphate HG**

Dvokomponentno đubrivo koje sadrži sekundarne makroelemente magnezijum i sumpor. Zbog svog visokog kvaliteta formulacije može da se primenjuje folijarno, ali i preko sistema za navodnjavanje. Primenjuje se za ishranu ratarskih, povrtarskih, voćarskih kultura kao i drugih poljoprivrednih kultura na svim tipovima zemljišta.

Količina primene:

Folijarno 0,1-0,5% rastvorom (1-5 g/l vode)

Fertigacijom 20-30 kg/ha

Može se upotrebiti više puta u toku vegetacione sezone.

**Nutrivit
Calcium
Nitrate HG****Nutrivit Calcium Nitrate HG**

Jedinstvena formulacija nitrarnog azota i potpuno rastvorljivog kalcijuma. Kalcijum jača ćelijske zidove i omogućava duže skladištenje plodova, povećava tolerantnost biljaka na prisustvo bolesti, a zajedno sa azotom olakšava usvajanje katjona Mg i K. Primenjuje se za ishranu svih poljoprivrednih kultura na svim tipovima zemljišta.

Količina primene:

Folijarno 0,3-0,5% rastvorom (3-5 g/l vode)

Fertigacijom 20-30 kg/ha

Može se upotrebiti više puta u toku vegetacione sezone.



Fertigal[®]

Fertigal CaB Organo

Fertigal CaB Organo je tečno đubrivo koje sadrži kalcijum u obliku kalcijum oksida (CaO). U simbiozi sa borom, kalcijum iz preparata Fertigal CaB Organo se olakšano usvaja preko korena i lista. Ova specifična formulacija sadrži i azot u amidnom obliku sa kontrolisanim otpuštanjem koji povoljno utiče na optimalan vegetativni porast. Visok sadržaj organske materije poboljšava usvajanje mineralnih elemenata i njihovu pokretljivost kroz biljna tkiva.

Količina primene:

Folijarno 2 – 3 l/ha ili 10 – 20 l/ha fertigacijom.

Može se upotrebiti više puta tokom vegetacije u zavisnosti od potrebe biljne kulture.



Fertigal Eklomaks

Fertigal Eklomaks je tečni ekstrakt najbrže rastuće morske alge *Ecklonia maxima*. Izdvajanje auksina i citokinina iz algi se vrši jedinstvenim metodom gde ne dolazi do denaturacije navedenih biljnih hormona. Auksini direktno utiču na razvoj i porast bočnih korenova. Posebno su značajni za razvoj korena biljaka koje se raseđuju reznicama. Citokinini utiču na više fizioloških funkcija, fotosintezu i poboljšavaju kvalitet plodova. Primena u usevima plodovočastog povrća na različitim tipovima zemljišta.

Količina primene:

Biljke koje se raseđuju potopiti pre raseđivanja pola sata u rastvor 0,1 l preparata na 10 l vode.

Folijarno 1 - 2 l/ha dva puta tokom sezone.

Fertigacijom 2-3 l/ha.



Fertigal Silika

Fertigal Silika sadrži visoku koncentraciju silicijuma (Si) uz kalijum (K) i huminske kiseline koje olakšavaju usvajanje navedenih elemenata. Silicijum pored mnogih fizioloških procesa, sa kalcijumom i pektinima utiče na povećanje čvrstine ćelijskih zidova. Na ovaj način povećava se čvrstina zeljastih izdanaka i plodova. Takođe utiče na povećanje otpornosti prema prouzrokovateljima bolesti, a nakon berbe omogućuje se duže skladištenje plodova.

Količina primene:

Folijarno 2 – 3 l/ha ili 5 – 7 l/ha fertigacijom.



Fertigal Cu Bactoclean

Fertigal Cu Bactoclean je proizvod na bazi bakra u organskom kompleksu. U navedenom kompleksu se povećava rastvorljivost, stabilnost i otpornost bakra na dekompoziciju pod uticajem svetlosti, temperature i različitih pH vrednosti. Bakar je nezamenljiv u nekoliko enzimskih procesa i utiče na pravilan porast biljaka.

Količina primene:

Folijarno 1 – 3 l/ha





Sorte semenske pšenice

AVENUE

VEOMA RANA SORTA



- ▶ **Visok potencijal prinosa**
Kombinuje više pozitivnih osobina važnih za formiranje prinosa.
- ▶ **Nova ranostasna sorta**
Izrazito rano klasa, što može da bude od velike koristi za izbegavanje toplotnih udara.
- ▶ **Pogodna za većinu regiona**
Veoma prilagodljiva različitim uslovima. Dobra tolerancija na najznačajnije bolesti.

PŠENICA ČISTA PETICA

AVENUE
LG ANERI
NIKOL
LG ASTROLABE



LG ANERI

SREDNJE RANA SORTA



- ▶ **Visok potencijal i odličan kvalitet zrna**
Srednje visoka sorta dobre tolerantnosti na poleganje, obrazuje dobro razvijen klas bez osja, krupnog zrna, visoke hektolitarske mase i dobrog kvaliteta.
- ▶ **Tolerantna sorta na ekonomski značajne bolesti**
Svakako značajan faktor proizvodnje strnih žita jeste poboljšana tolerantnost na fuzariozu klasa kao i drugih ekonomski značajnih bolesti.
- ▶ **Pogodna za različite agroekološke uslove proizvodnje**
Srednje rana sorta koja će se lakše prilagoditi različitim uslovima proizvodnje na ovim prostorima.

NIKOL

SREDNJE RANA SORTA



- ▶ **Veoma rodna sorta**
Nikol je sorta za intenzivne uslove i primenu pune agrotehnike. Ume da vrati uloženo.
- ▶ **Veoma dobro razvijen klas**
Važan faktor za visinu prinosa. Formira veoma krupno zrno.
- ▶ **Dobar odnos prema bolestima**
Visoka tolerancija na rđu i fuzariozu klasa. Preporučuje se preventivni tretman na pegavost.

NOVO

LG ASTROLABE

OZIMA SREDNJE RANA SORTA



- ▶ **Agronomske osobine**
 - ➡ Stablo srednje visine
 - ➡ Intenzivno bokorenje
 - ➡ Dobro podnosi niske temperature
 - ➡ Nešto kasnije ulazi u vlatanje
 - ➡ Rano klasa, klas s osjem, dobro razvijen
 - ➡ Tolerantan na poleganje
 - ➡ Visoka hektolitarska masa
- ▶ **Kvalitet**
 - ➡ Hlebna sorta odobrena od asocijacije francuskih mlinara
- ▶ **Odnos prema bolestima**
 - ➡ Visoka tolerancija na septoriju i mrku rđu
 - ➡ Veoma dobro se nosi sa pepelnicom i truleži korena i prizemnog dela stabla
 - ➡ Prosečna tolerancija na žutu rđu i fuzariozu klasa

Sačuvajmo životnu sredinu!



Poštovani korisnici, pored pravilne upotrebe sredstava za zaštitu bilja, veoma je važno postupanje sa ispražnjenom ambalažom. Ispražnjena ambalaža je opasan otpad koji može da ugrozi zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu. Pravilno postupanje pri korišćenju sredstava za zaštitu bilja podrazumeva trostruko ispiranje ispražnjene ambalaže. Ispiranje ambalaže krajnjem korisniku omogućava maksimalno iskorišćenje preparata, uštedu novca, ispunjenje zakonskih obaveza i zdravije životno okruženje.

Uputstvo za trostruko ispiranje ambalaže:

Ispražnjenu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je isprati odmah nakon pražnjenja kako se sredstvo za zaštitu bilja ne bi osušilo u unutrašnjosti ambalaže. Postupak trostrukog ispiranja ambalaže se obavlja na sledeći način:

- ✓ Nakon upotrebe sadržaj ambalaže se isprazni u rezervoar prskalice i ostavi da se ocedi oko 30 sek.
- ✓ Čistom vodom napuni se trećina ambalaže, zatvori, sadržaj snažno promućka, kako bi voda došla do svih unutrašnjih površina.
- ✓ Zatvarač ambalaže se skine, sadržaj ambalaže prospe u rezervoar prskalice i ostavi da se ocedi oko 30 sek.
- ✓ Ovaj postupak se ponavlja još dva puta korišćenjem čiste vode.
- ✓ Ambalaža se probuši na tri mesta i tako učini neupotrebljivom.
- ✓ Zatvarači i boce se odvojeno pakuju u polietilenske kese.



ENVIPACK d.o.o. je jedini specijalizovani operater za upravljanje otpadnom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja, osnovan od strane kompanije Galenika-Fitofarmacija a.d. sa ciljem da obezbedi sistem za sakupljanje i zbrinjavanje otpadne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja na celoj teritoriji Republike Srbije.

ENVIPACK d.o.o. na vaš zahtev, a u ime svih odgovornih proizvođača i uvoznika sredstava za zaštitu bilja, koji prepoznaju svoju ulogu u sistemu, organizuje sakupljanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada.

Korisnici sredstava za zaštitu bilja, pridružite nam se u nastojanju da efikasno, ekonomično i praktično rešimo problem ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja na čitavoj teritoriji Republike Srbije!

ENVIPACK d.o.o.

tel. 011 / 3072 335, mob. 063 / 458 248; mob. 063 / 10 99 187; office@envipack.rs; www.envipack.rs



GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

REGIONALNI MENADŽERI

1 Branka Jelušić dipl. ing.
mob. 063 861 3071
branka.jelusic@fitofarmacija.rs

Branislav Antunović dipl. ing.
mob. 062 231 034
branislav.antunovic@fitofarmacija.rs

2 Slavica Nerac dipl. ing.
mob. 063 106 12 99
slavica.nerac@fitofarmacija.rs

3 Milan Trbojević dipl. ing.
mob. 063 457 351
milan.trbojevic@fitofarmacija.rs

4 Milica Mijatov mast. inž.
mob. 063 104 22 28
milica.mijatov@fitofarmacija.rs

5 Dragan Hrnjak dipl. ing.
mob. 063 458 150
dragan.hrnjak@fitofarmacija.rs

5a Nedeljka Trivunović dipl. ing.
mob. 063 532 573
nedeljka.trivunovic@fitofarmacija.rs

6 Lidija Mitić dipl. ing.
mob. 063 457 956
lidija.mitic@fitofarmacija.rs

Ana Đorđević dipl. ing.
mob. 063 457 168
ana.djordjevic@fitofarmacija.rs

7 Lazarela Lončarski dipl. ing.
mob. 063 457 710
lazarela.loncarski@fitofarmacija.rs

8 Ivan Tanasijević dipl. ing.
mob. 063 250 823
ivan.tanasijevic@fitofarmacija.rs

Dušan Ilić
mob. 062 217 288
dusan.ilic@fitofarmacija.rs

9 Miloš Nešković dipl. ing.
mob. 063 109 91 84
milos.neskovic@fitofarmacija.rs

10 dr Radivoje Aćimović
mob. 063 457 714
radivoje.acimovic@fitofarmacija.rs

Stevan Marinković dipl. ing.
mob. 063 457 114
stevan.marinkovic@fitofarmacija.rs

11 Koviljka Teomirović dipl. ing.
mob. 063 10 53 977
koviljka.teomirovic@fitofarmacija.rs

12 Dragana Dimkowska dipl. ing.
mob. 063 1040 476
dragana.dimkowska@fitofarmacija.rs


Nataša Nikolić Mitić dipl. ing.
mob. 063 458 160
natasa.nikolic@fitofarmacija.rs

13 Sreten Rilak dipl. ing.
mob. 063 457 891
sreten.rilak@fitofarmacija.rs

14 Goran Petrović dipl. ing.
mob. 063 457 739
goran.petrovic@fitofarmacija.rs

15 Strahinja Jovanović dipl. ing.
mob. 063 1040 149
strahinja.jovanovic@fitofarmacija.rs

16 Milan Jović dipl. ing.
mob. 062 217 290
milan.jovic@fitofarmacija.rs



Sektor prodaje: 11080 Beograd, Batajnički drum bb

Sektor marketinga / Odeljenje primene

Specijalista za povrtarstvo Stanoje Branković dipl. ing. | mob. 063 85000 60; stanoje.brankovic@fitofarmacija.rs

Specijalista za voćarstvo Ivan Stevanović mast. inž. | mob. 063 457 013; ivan.stevanovic@fitofarmacija.rs

www.fitofarmacija.rs

